

알라질^注

아스피린산

전문의약품

분류번호:114

알라질^注는 스위스 Arthromedica사에서 개발한 아스피린산 주사제로서 경구용 아스피린에 비해 위장장애가 적고, 진통 · 해열 및 소염효과가 4~5배 높은 수용성 주사제입니다.

성상 백색 내지 미황색의 가루가 무색투명한 바이알에 든 주사제

성분 · 함량 Val (1g)중
주사용 아스피린산 90% (별첨규격) ······ 1g
(아스피린산으로 900mg)

약리작용

- 1. 진통작용**
동등발생물질인 Bradykinin 등에 길항하여 진통작용을 나타내며, 주사후 5~30분에 효과가 발현되어 4~6시간 지속되고, Morphine · HCl 10mg에 대응하는 진통작용을 나타내므로 수술 후 및 그 밖의 모든 통증에 사용합니다.
- 2. 해열작용**
시상하부의 체온조절 중추에 작용하여 해열작용을 나타내므로 감기, 몸살 등의 발열성 질환에 사용합니다.
- 3. 항류마티즘작용**
염증유발물질인 Prostaglandin 등의 합성을 억제하여 염증조직에 작용하므로 원발성 류마티즘 및 골관절염, 활막염, 관절주위염, 요통, 경부골관절염 등의 속발성 류마티즘 질환과 같이 통증을 수반하는 증상에 대해 진통 및 항류마티즘작용을 나타냅니다.
- 4. 수용성**
아스피린에 리신을 결합시킨 염의 형태로 되어 있으며, 용해보조제인 Aminoacetic Acid가 첨가되어 있으므로 수용성이 높습니다.

효능 · 효과 만성통증, 수술후 통증

용법 · 용량 성인: 아스피린산으로서 1일 0.9~3.6g (아스피린으로서 0.5~2.0g)을 분할 정맥주사합니다. 심한 통증에는 1회 1.8g (아스피린으로서 1.0g)을 투여합니다. 사용시에는 경구투여가 불가능한 경우 또는 효과가 불충분한 경우에만 사용하고 경구투여가 가능해진 경우에는 신속히 바꾸어야 합니다.

사용상의 주의사항

- 1. 경고**
 - 1) 심한 속이 발생할 수 있습니다.
 - 2) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
- 2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.**
 - 1) 이 약 또는 다른 살리실산제에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 소화성궤양 환자
 - 3) 아스피린전신 쇼크 그 병력이 있는 환자
 - 4) 혈우병 환자
- 3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**
 - 1) 신장에 환자
 - 2) 출혈경향이 있는 환자(혈소판 기능이상을 일으킵니다.)
 - 3) 기관지천식 환자
 - 4) 수술전의 환자
 - 5) 14세이하의 어린이
- 4. 이상반응**
 - 1) 속: 드물게 속을 울릴 수 있으므로 충분히 관찰하고 안검부종, 혈압저하, 맥박미약, 의식혼돈 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 하십시오.
 - 2) 과민증: 때때로 발진, 부종, 두드러기, 비염과 같은 증상, 결막염 등의 과민증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
 - 3) 피부: 드물게 리엘증후군(중독성 피부과증상), 스티븐스-존슨증후군(피부점막인증후군), 박탈성 피부염이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 있을 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 하십시오.
 - 4) 혈액: 드물게 재생불량성빈혈, 빈혈, 백혈구감소, 혈소판감소, 혈소판기능저하(출혈시간의 지연) 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 있을 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 하십시오.
 - 5) 소화기: 식욕부진, 가슴쓰림, 딸꾹질, 위통, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있고 정기투여시 위장관에 대한 이상반응 특히 위정출혈, 소화성궤양 및 전염이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 정신신경계: 이명, 난청, 현기, 두통, 혼란 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 감량하거나 투여를 중지하십시오.
 - 7) 간장: 드물게 간장애가 나타날 수 있습니다.

- 8) 신장 : 드물게 신장에 나타날 수 있습니다.
- 9) 호흡기 : 때때로 객담배출 곤란이 나타날 수 있습니다.
- 10) 투여부위 : 때때로 혈관통이 나타날 수 있습니다.
- 11) 기타 : 때때로 열감, 발한이 나타날 수 있습니다. 또한 과호흡, 대사성 산증 등이 나타날 경우에는 혈중농도가 현저하게 상승할 수 있으므로 감당하거나 투여를 중지하십시오.

5. 일반적 주의

- 1) 해열의 목적으로는 긴급을 요하는 경우에 한하여 사용하십시오.
- 2) 속 등의 과민반응을 예측하기 위하여 투여전에 알레르기병력, 약물과민증 등의 여부를 확인하는 등 미리 충분히 문진하고 속발 생애에 나타난 극단치 증례를 하여 두는 것이 좋습니다. 또는 소량주입후 환자의 상태를 충분히 관찰하거나 투여후에도 환자를 안정한 상태로 유지시키고 충분히 관찰하며 이상이 있을 경우에는 적절한 조치를 하십시오.
- 3) 살리실산제와 레이중추근과의 인과관계는 명확하지 않으나 관련성이 있다는 역학조사 보고가 있으므로 14세이하의 수도 또는 인플루엔자 환자에는 부득이한 경우에 한하여 신중히 투여하고 투여후 환자의 상태를 충분히 관찰하십시오.
(레이중추근 : 어린이에 있어 매우 드물게 수두, 인플루엔자 등의 바이러스성질환에 뒤이은 상한 구토, 의식장애, 경련(급성뇌부종), 지열당 등)의 장기에 지장형착, 미토콘드리아변형, GOT, GPT, LDH, CPK의 급격한 상승, 고암모니아혈증, 저혈당증 등의 증상이 단기간에 발현하는 중세로 사망률이 높음)
- 4) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법에 유의하십시오.
- 5) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
(1) 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 하십시오.
(2) 약물요법 이외의 치료법도 고려하십시오.
- 6) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
(1) 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여하십시오.
(2) 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피하십시오.
(3) 원인요법이 있으면 그것을 실시하십시오.
- 7) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 이상반응의 발현에 유의하십시오.
- 8) 과경자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 이상반응의 발현에 특히 유의하십시오.
- 9) 수술전 1주 이내에 아스피린을 투여한 예에서 손실혈량량의 유의성 있는 증가가 보고되었습니다.

6. 상호작용

- 1) 쿠마린계 항응혈제(와르파린), 당뇨병용제 (인슐린제제, 통루타이드 등)와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여하십시오.
- 2) 프로베나이드와 병용투여시 요산배설 작용이 억제됩니다.
- 3) 메토크세이트 : 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 및 살리실산과의 병용투여로 신세뇨관에서 메토크세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토크세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 고용량의 메토크세이트(15mg/주 이상)는 아스피린과 병용투여하지 않으며 병용투여하는 경우에는 저용량의 메토크세이트와 신중히 투여하여야 합니다.
- 4) 다른 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 및 살리실산과 병용투여할 경우 출혈을 증가시키거나 신기능을 감소시킬 수 있으므로 병용투여하지 않습니다.

7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 기형발생이, 사람에게는 임신말기에 투여한 환자와 신생아에 출혈이상이 나타났다는 보고가 있으므로 임부(12주 이내 또는 임신말기)또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여하지 않습니다.
- 2) 임신말기의 랫드에 투여한 실험에서 태자의 동맥관수축이 보고되어 있습니다.
- 3) 이 약은 유즙으로 이행이 일어나므로 수유부에는 투여하지 않습니다.
- 4) 미숙아, 신생아, 유아 또는 5세이하의 어린이에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다)

8. 적용상의 주의

- 1) 투여시에는 환자를 옆으로 눕히고 1시간을 3분이상 천천히 주십시오.
- 2) 용해후 2시간 이내에 사용하십시오.
- 3) 정맥주사시만 사용하십시오.

포 장 단 위
저 장 방 법

1g(바이알) x 6, 10, 25, 50 1g(바이알) x 50(수출용) / 1g(바이알(군납용))

밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

(민일 육안으로 이물이 발견될시는 사용하지 마십시오. 20℃ 이하에서 보관하고 증류수를 가한 후 1분 이상 흔들어 주십시오.)

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 약약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

설립서 개정연월일: 2008. 04. 11

P0812-09

제조의회사 :



일양약품주식회사

제조사 :



주비씨월드제약

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금무관전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.lyang.co.kr

경기도 여주군 가남면 삼곡리 11