

알코텔[®]정

(메타독신)

KGMP
적격업체제품

현대인들에게 음주는 개인적인 스트레스해소법의 하나로서 뿐만 아니라, 원만한 사회적 관계를 유지하기 위한 윤활유로 작용하지만 그 부작용에 있어서는 필요악이 되고 있습니다.

일단, 섭취한 알콜은 우리 몸속에 저장될 수가 없어서 에너지로 쓰이고 남은 알콜은 주로 간에서 산화과정을 거쳐 제거됩니다. 알콜대사에 있어 간은 상당히 중요한 역할을 하며 따라서, 과도한 음주나 습관적인 음주는 간의 알콜대사능력에 한계를 가져와 결국 간기능을 악화시키게 됩니다. 기능이 약화된 간은 알콜의 대사과정중에 생기는 아세트알데하이드라는 세포독성 물질을 처리할 능력이 떨어져 체내에 축적되게 되는데 이 물질이 바로 숙취현상을 일으키는 주원인이 되고 있습니다. 뿐만 아니라, 이러한 알콜대사이상은 간에서의 정상적인 생화학반응을 방해하여(NAD/NADH 비율의 불균형초래)지질의 간내침착을 유도함으로써 지방간을 비롯한 각종 간질환을 일으키게 됩니다. (알코텔[®])은 간에서 알콜대사(산화)과정에 직접 관여하여 혈중알콜농도는 물론 아세트알데하이드농도를 신속히 저하시킴으로써 아세트알데하이드의 체내 축적을 막고 간에서 일어나는 생화학반응을 정상화(NAD/NADH 비율의 정상화)및 활성화시켜, 과도한 음주나 습관적인 음주로 인한 알콜중독과 간손상 및 알콜성 간질환등 각종 간질환을 효과적으로 치료, 예방해 주는 새로운 알콜성 간질환 및 알콜중독 전문치료제입니다.

성상	갈색의 원형 필름 코팅정제
성분·함량	1정중 메타독신(별규)..... 500mg 첨가제(타르색소) : 오파드라이81W46500(황색5호, 청색2호, 적색40호)

- 약리작용**
- 알콜대사의 관건은 혈중알콜 및 알콜의 분해산물인 아세트알데하이드의 신속한 처리와 간내 화학대사의 원활한 조절에 있습니다. (알코텔[®])은 다음과 같은 기전으로 알콜대사를 원활하게 해주어 각종 알콜성 간질환을 예방 및 치료하여 줍니다.
1. 알콜의 분해 및 대사를 촉진합니다.
 - ① 간에서 알콜대사에 관여하는 효소(ADH/ ALDH)활성을 증가시켜 알콜대사과정을 촉진시키므로 혈중 알콜농도 및 아세트알데하이드의 농도를 신속히 저하시킵니다. 따라서 알콜로 인한 급·만성알콜중독(만연홍조, 오심, 구토 등)증상을 신속히 개선하며, 알콜에 의한 피해를 최소화합니다.
 - ② 간세포의 산화환원상태(NAD/NADH비율)를 정상화하여 알콜대사 효소의 활성도를 증가시키며 또한 간에서 일어나는 인체의 여러 생화학반응을 정상화 또는 활성화시킵니다.
 2. 알콜로 인한 간손상의 예방 및 치료에 효과적입니다.
 - ① 간세포를 파괴시키는 독성물질인 과산화지질로부터 간세포를 보호하는 내인성 glutathione의 생성 및 활성을 증가시켜 세포막 손상을 방지합니다.
 - ② 간의 에너지(ATP)대사를 정상화시킴으로써 간세포의 정상적인 활동을 유지시켜 줍니다.
 - ③ 간질환이 있을 경우, 상승된 SGOT, SGPT, γ -GT, Bilirubin 등의 혈액학적 인자들을 정상으로 낮추어 줍니다.
 - ④ 간기능 손상으로 오는 비정상적인 아미노산대사를 정상화시켜 줍니다.
 3. 알콜로 인한 중추신경억제현상을 정상화시킵니다.

알콜의 만성적인 섭취로 인한 기억력 저하, 집중력 저하 등 CNS증의 원인인 신경전달물질(GABA, Acetylcholine, Dopamine, Serotonin)의 이상을 정상화시키며, 뇌에너지대사를 개선시켜 알콜로 인한 급만중상, 우울, 흥분 등의 알콜중독증을 치료해 줍니다.

※ 알콜성간질환이란 알콜성 간염, 알콜성간부전(급성, 아급성, 만성, 간성혼수무), 알콜성간염증 및 간경화증, 알콜성지방간, 알콜성간경변 및 상세불명의 알콜성간질환을 포괄하는 질환을 말합니다. (한국표준질병사인분류)

- 효능·효과** 알콜성 간질환, 만성 알콜중독
- 용법·용량** 성인 : 메타독신으로서 1회 500mg, 1일 2회 경구투여하십시오.
증상에 따라 적절히 증감하십시오.
- 사용상의 주의사항**
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 임부 및 수유부(수유 중인 경우 저프로린혈증을 일으킬 수 있습니다.)
 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

레보도파를 투여받고 있는 파킨슨병 환자
 3. 이상반응

과량투여 및 장기간 치료시 감수성이 예민한 환자에서 투여중단시 가역적인 말초 신경병이 드물게 나타날 수 있습니다.
 4. 상호작용

이 약은 레보도파의 말초카르복실작용을 증가시켜 효과를 감소시킬 수 있습니다.
 5. 과량투여

동물시험에서 1일 경구투여량의 60-120배에서 과다호흡, 경련이 나타났습니다.
 6. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 의약품은 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

포장 단위 자사포장단위

저장 방법 기밀용기, 실온보관

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

설명서 개정연월일: 2006.08.03

제조·판매원

원료·기술공급원

P0902-06



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilmyang.co.kr

UNDER LICENSE FROM LABORATORI
BALDACCIS P.A. MARKETING UNDER
AGREEMENT WITH EURODRUG LABORATORIES

eurodrug
laboratories