

소화촉진 · 가스제거제

토파제® 정

(판크레아틴/셀룰라제/우담즙건조엑스/디메티콘)

Topase Tab.

[성분 · 함량] 1정 중

· 유효성분 : 판크레아틴(USP).....	175.0mg
셀룰라제(KP).....	50.0mg
우담즙 건조엑스(생규)(콜란산(으)로서 11.25mg).....	25.0mg
디메티콘(NF).....	25.0mg
· 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유), 우담즙 건조엑스(소, 닭즙), 판크레아틴(돼지, 돼장)	
· 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호	
· 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 탭실드녹색(39G402), 탭실드 클리어(92C569), 탭실드흰색(19W623), 히드록시프로필셀룰로오스	

[성 상] 장방형의 장용피를 한 연녹색의 필름코팅정

[효능 · 효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체할, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

[용법 · 용량] 만 15세 이상 성인 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고, 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정/병, 300정/병

제조회사 : (주)메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

제 조 자 : 정우신약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질 관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질 · 훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 피해구제 제도 전용 상담 전화번호 : 14-3330

※ 첨부문서 작성일자 2023년 03월 20일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품문의 및 상담은 메디카코리아(1522-1131)로 문의바랍니다.

MK23032020-H