

대장근육기능 이상 치료제

옥티란® 정 40mg

(브롬화옥틸로늄)

불안, 긴장, 스트레스, 무절제한 생활, 자극성 기호품의 과다섭취 및 하제의 오용 등에 따른 뇌신경 중추나 자율신경 중추의 자극으로 인하여 나타나는 기능성 장질환을 과민성 대장증후군이라 하는데 주로 복통, 점액변, 설사, 변비, 설사·변비의 교대, 복부불쾌감 및 복부팽만감 등의 증상을 보이며 정신적 스트레스를 많이 받는 20대~50대의 정신근로자와 주부들에 특히 많이 나타납니다.

옥티란® 정은 대장에 선택적으로 강력하게 작용하여 대장의 운동기능을 신속히 정상화시켜 과민성 대장증후군을 비롯하여 위장관의 경련증 및 기능저하증에 우수한 치료효과를 발휘하며 또한, 옥티란® 정은 항콜린제의 투여에서와 같은 전신적인 이상반응이 거의 없으므로 안심하고 복용할 수 있습니다.

【성 상】 주황색 원형 정제

【약리작용 및 특징】

1. 옥티란® 정은 장관평활근의 근세포내로 칼슘이온이 유입되는 것을 억제하여 직접적인 근이완 효과와 강력한 진정작용을 나타냅니다.
2. 옥티란® 정은 복용후 30분부터 복통, 설사, 변비 및 복부 팽만감 등의 자각증상을 없애주기 시작하며 또한 지속적으로 효과를 나타내어 과민성대장증후군, 위장관의 경련증 및 기능 저하증에 90% 이상의 치료효과를 나타냅니다.
3. 옥티란® 정은 자율신경계에는 작용하지 않고 위장관 평활근에만 선택적으로 작용하므로 항콜린제 투여에서와 같은 구갈, 현기증, 배뇨장애, 서맥 등의 전신성 이상반응이 없어 안심하고 복용할 수 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

브롬화옥틸로늄(KPC) 40mg

첨가제(타르색소) : 황색5호

【효능·효과】

위·장관 경련 및 과민성 대장증후군

【용법·용량】

성인 : 브롬화옥틸로늄으로서 1회 20~40mg(1/2~1정)을 1일 2~3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 녹내장 환자

【저장 방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장 단위】 30정(병), 300정(병)

※ [최신 제품 정보확인 방법] 이 첨부문서 작성일자(2011. 02. 08) 이후 변경된 내용은 아래에 표시된 홈페이지나 고객센터를 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 [이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 정보마당 → 의약품등 정보]를 참조하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전청[이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고]에 알리기 바랍니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다.

(K-2)



제조판매원

진양제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 서초3동 1532-9 (T: (02)3470-0300)

공정 : 경기도 안산시 단원구 초지동 649-3 (T: (031)494-8196)

고객상담실 : (02)3470-0350 홈페이지 : www.jinyangpharm.com