

세론정
(부스피론염산염)

유효성분 : 부스피론염산염(USP) 5mg

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소

【성상】 흰색 타원형의 정제

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

20~30mg를 분할투여하는 것이 바람직하다. 1일 총투여량은 60mg를 초과하지 않는다.

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 중증의 간·신장에 환자가 있으면 주로 간장에서(대사되고 신장에서 배설된다)
- 3) 간질 환자
- 4) 급성 혈우각형 뇌내압 환자
- 5) 중증의 근육경직 환자
- 6) MAO저해제를 투여중인 환자
- 7) 이 약을 복용할 수 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), 락포 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 장애(galactose-catalactase maldigestion) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2) 중추신경계 : 수면장애, 졸음, 어지러움, 신경통, 흥분, 불안, 때때로 이인증, 불쾌감, 소용돌이감, 다형성, 장기간 청각기능을, 공포감, 의욕상실, 의식장애 등 나타날 수 있다.

- [illegible]

2) 각 환자에 대한 이 약의 중추효과는 예견할 수 없으므로 이 약 투여가 환자에게 바람직하지 않은 작용을 미치지 않는다는 것이 확인될 때까지는 자동적으로 투여할 수 없다. (기타 부작용은 미지하다)

- [illegible]

2) 이 약과 알코올과의 상호작용 연구결과, 이 약은 알코올이 유발시킨 운동 및 정신기능장애를 증가시키지 않는다고 보고되어 있으나 이 약과 알코올은

- 3) 이 약과 트라조돈의 병용투여시 ALT가 3-6배 증가하였다는 보고가 있었으나 이 현상을 모사하여 시도한 비슷한 실험에서는 간트렌스아미나제에 대 한 상충작용은 인정되지 않았다.

- 4) 이 약은 페니토인, 프로프라놀롤, 와르파린 등 혈청 단백질과 강하게 결합하는 약물은 치환시키지 않았으나 디카신과 같이 약하게 결합하는 약물은 치환시킬 수 있다. 그러나 이러한 특성의 임상적 중요성은 알려지지 않았다.
- 5) MAO저해제와 병용투여시 협압이 상승될 수 있으므로 병용투여하지 않는다.

1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확보되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 동물실험(랫트)에서 이 약 및 그 대사물의 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 투여중에는 수유를 피한다.

18세 이하의 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

- 1) 증상: 건강한 남성지원자에게 1일 375mg을 투여한 경우 구역, 구토, 어지러움, 출혈, 축농, 위장장애 등이 관찰되었으며 고의 또는 사고로 이 약을 과량투여한 경우의 사망에는 보고된 바 없다.
- 2) 처치: 일반적인 대증 및 보조요법을 위생적과 함께 실시하여 호흡, 역박, 혈압을 모니터한다. 이 약의 특별한 해독제는 알려져 있지 않으며 투석용이성도 결정되지 않았다.

- ① 약의 안전성과 효과적인 사용을 위해 다음과 같은 사항을 반드시 지켜야 하는 약에 속하지 않는다.
- ① 현재 복용하거나 약 투여중에 사용하고 있는 약과 사용하는 약의 적응증의 범주에 관계하여 의사에 말한다.
- ② 사용중인 모든 약을 개괄하고 말한다. 약 목록에 포함되지 않은 약과 처방전 없이 구입한 약도
- ③ 유산과 관련된 의약품에 대해서도 말한다.
- ④ 약의 사용에 관하여는 가능한 한 정보를 유익하게 제공한다.
- ⑤ 약의 사용에 대해서는 적절한 평가가 필요하여 약의 오·남용상(내성, 용량 증가, 폐기 등)을 면밀히 관찰한다.

가. 시험과 영동부스피론정(0.1mg)그(영동부스피론정(0.1mg)대조와 보령부스피론정(0.1mg)대조)를 2×2 교차시험으로 시험과 1정 또는 대조와 2정을 건진한 성인에게 공복 시 단일 경구투여하여 56명의 혈중부스피론을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로-변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

(부스피론)

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24h} (pg · hr/mL)	C _{max} (pg/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	보령부스파정500리그램 (보령제약(주))	1292 ± 1098	702.3 ± 625.4	0.75 (0.33~2.00)	2.70 ± 1.02
시험약	영풍부스파리튬정10리그램 (영풍제약(주))	1182 ± 1077	699.0 ± 862.3	0.50 (0.25~3.00)	2.45 ± 0.74
90% 신뢰구간 (기준: log 0.8~log 1.25)		log0.8370~1.0247	log0.8247~1.0500	-	-

(AUC, C_{max}, t_{1/2} : 평균값 ± 표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n=56)

AUC: 투약시간부터 최종발증농도 측정시간 1까지의 발증농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도

$$T_{max} : \text{최고회전속도 (rpm)}$$

h2 : 앞단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그

나. 의학공동동성시험기준 제7조제2항에 따라, 시험의 영문부스피본전5일리그램(영문제약(주))은 대조약 영문부스피본전10일리그램(영문제약(주))과의 비교용출 시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출양상이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였다.

* 이 약은 영풍제약(주) 영풍부스피론정5일리그램 및 영풍부스피론정10일리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 농장을 영풍제약(주)에 위탁 제조하였음.

【포장단위】 30정/병 100정/병 500정/병

【저장방법】 기밀용기, 실온보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【제조업체】 진양제약(주) / 강원도 원주시 지정면 신평로 34

【제조사】 영풍제약(주) / 인천광역시 남동구 함박외로 333

* 본 제품을 복용하기 전에 사용설명서를 주의깊게 읽어야 하며, 사용설명서는 본 제품과 함께 보관하십시오.

본 약의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 부지용 피해구제 신청 : 한국미아불안센터 전화(644-6223)