

메네스 정

(베타히스틴메실산염)

전문의약품

분류번호 116

메니에르병에 의한 어지러움 치료제

MENIACE Tablets

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

베타히스틴메실산염(KP)-----6mg

■ 성상

원색의 정제

■ 효능·효과

메니에르병에 의한 어지러움

■ 용법·용량

성인 : 베타히스틴메실산염으로서 1회 6~12mg 1일 3회 식후에 경구투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 부신종양 환자

2) 크롬친화세포종 환자

3) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자

4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 소화성 궤양의 병력이 있는 환자 또는 활동성 소화성 궤양 환자

2) 천식 환자

3) 항히스타민제를 투여중인 환자

3. 이상반응

1) 소화기계 : 설사, 식욕부진, 복부팽만감 드물게 구역, 구토, 위통 등이 나타날 수 있습니다.

2) 기타 : 두드러기, 심계항진, 흥분감, 흥통, 발한, 일시적인 홍반성 발진 등이 나타날 수 있습니다.

4. 상호작용

항히스타민제와 병용시 이 약의 작용을 감소시킨다는 보고가 있으므로 신중히 투여합니다.

5. 임부에 대한 투여

임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회하는 경우에만 투여합니다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다.).

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 용량을 감소하는 등 주의합니다.

8. 과량투여시의 처리

베타히스틴메실산염의 과량투여에 대한 보고는 없습니다. 2명의 환자가 베타히스틴염산염으로서 200mg 이상의 용량에서 일시적인 경도도 내지 중도도의 증상(구강건조증, 복통, 졸림, 구역)을 경험하였습니다. 베타히스틴염산염으로서 728mg을 복용한 경우 경련이 보고되었습니다. 모든 경우 과량투여시의 증상은 완전히 회복되었습니다.

과량투여시의 처리는 일반적인 보조 처치를 실시해야 합니다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 햇빛 및 습도를 피하여 보관합니다.

3) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않습니다.

■ 저장방법 : 차광한 밀폐용기

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 30정, 500정

■ 제조회 : (주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.

* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일(2014년 07월 21일)변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품등 정보' 나 소비자상담실 (080-611-8690 수신자부담)으로 문의하시어 확인할 수 있습니다.



제조발매원

(주)동구바이오제약

본사 : 서울특별시 구로구 교척로 222

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

www.dongkoo.com