

세닐톤® 정

조제용

일반의약품

분류번호 255

전립선질환 치료제

CERNILTON Tablets

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

세닐톤 T60(별규)----- 60.0mg

세닐톤 GBX(별규)----- 3.0mg

첨가제 (타르색소) : 청색 1호(AL), 황색 5호(AL), 황색203호(AL)

■ 성 상

당류색 원형의 필름코팅정제

■ 효능 · 효과

1. 만성 전립선(전립샘)염

2. 초기 전립선(전립샘) 비대증에 수반하는 다음의 증상 : 배뇨곤란, 빈뇨, 잔뇨 및 잔뇨감, 배뇨통, 요선세소, 회음부불쾌감

■ 용법 · 용량

성인 : 1일 2~3회 1회 2정씩 경구투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 지금까지 이 약에 대한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 사람

2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

2. 이상반응

1) 과민증 : 과민증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지합니다.

2) 소화기 : 때때로 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 변비 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.

2) 이 약은 근본적 치료제가 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)제이며 장기연용(계속사용)할 경우 치료를 지연시키고 그 결과 요로감염증 등 합병증을 유발시킬 수 있으므로 특히 주의하십시오.

3) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관합니다.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

■ 저장방법

차광 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위

30정, 60정, 100정, 120정, 1000정

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환 · 환불 받을 수 있습니다.

* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일(2012년 03월 31일)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)나 소비자상담실 080-611-8690(수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.



제조판매업

(주)동구바이오테크

본사 : 서울특별시 구로구 고척로 222

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제막공단2길 18

www.dongkoo.com

원료공급원

AB Cernelle
SWEDEN