

소화불량 · 과식 · 식체(체함)

세미론정

일반 의약품

분류번호 : 233

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 판크레아틴(KP) 175mg
우담즙건조엑스(생규)〈콜린산으로서 11.3mg〉 25mg
디메티콘(NF) 25mg
헤미셀룰라제(별규) 50mg
- 첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 203호
- 첨가제(동물유래성분) : 판크레아틴(돼지/취장), 우담즙건조엑스(소/담즙(쓸개즙))
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 톨크, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스프탈레이트

[성상] 연두색의 장방형 장용필름코팅정

[효능·효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 성인 1회 2정을 1일 3회 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
만 7세 이하의 어린이
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
3. 다음과 같은 사람의 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항.
정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기한] 포, 케이스 또는 용기라벨 표시일까지

[포장단위] 10정/상자(10정/PTP), 300포/상자(2정/포×300), 300정/병, 1000정/병

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 작성일(2023.02.01) 이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://jeyak.co.kr>이나 소비자 상담실로 문의 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

* 부작용보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)


오스틴제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20
소비자상담실: 080-010-5510