



20521

I KLC R11

전문의약품

분류번호:122

중추성 근이완제

IV IM

콘락스® 주사액

(프리디놀메실산염)

■ 원료약품 및 그 분량: 1앰플(1mL) 중

- 유효성분: 프리디놀메실산염(KP) 2.0mg
- 안 정 제: 타우린(KP) 10.0mg
- 완 충 제: 염화나트륨(KP) 7.0mg
- 용 제: 주사용수(KP) 적량

■ 성상

갈색 앰플에 든 무색투명한 액체

■ 효능·효과

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연축·요배통증, 경건완 증후군, 건관절 주위염, 변형성 척추증

■ 용법·용량

성인: 메실산프리디놀로써 1회 2mg 1일 1회 근육 또는 정맥주사한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 녹내장 환자(항콜린작용에 의해 안압을 상승시킬 수 있다.)
- 3) 전립선비대에 의한 배뇨곤란 환자(항콜린작용에 의해 배뇨장애를 악화시킬 수 있다.)
- 4) 중증의 심질환 환자(중상이 악화될 수 있다.)
- 5) 마비성 장폐색증 환자(중상이 악화될 수 있다.)
- 6) 거대 결장증 환자
- 7) 급성 폐부종 환자
- 8) 빈맥환자
- 9) 중증의 동맥경화증 환자
- 10) 위장관부위협착 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

간·신장에 환자

4. 부작용

- 1) 과민증: 발진, 두드러기, 드물게 아나필락시스 증상, 속유사증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 정신신경계: 때때로 어지러움, 비틀거림, 실신, 졸음, 불안, 환각, 무력감, 권태감 등이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 감량 또는 투여 중지 등 적절한 처치를 한다.
- 3) 골격근: 드물게 근이완, 근무력증, 장시간 정자불능 등이 나타날 수 있다.
- 4) 소화기계: 구갈, 드물게 구역·구토 등이 나타날 수 있다.
- 5) 피부: 한선분비감소, 홍반
- 6) 눈: 시조절장애, 협우각형녹내장이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

6. 상호작용

- 1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 병용투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이하게 투여하는 경우에는 감량하는 등 주의한다.: 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 바르비탈계 약물 등의 중추신경억제제, MAO 저해제
- 2) 다음 약물과의 병용에 의하여 약의 항콜린 작용이 증강될 수 있다.: 아만타딘, 퀴닌
- 3) 도파민길항제(메토프로람이드 등)와 병용시 위장관 작용을 상쇄시킨다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 이 약은 모유중으로 이행하므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

8. 소아에 대한 투여

유·소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

9. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

10. 적응상의 주의

- 1) 약의 주사는 경구투여가 불가능한 경우에만 사용한다.
- 2) 정맥주사
 - (1) 생리식염주사액 또는 5% 포도당 주사액에 섞어 사용하는 것이 바람직하나 부득이하게 단독 주사할 경우에는 주사속도를 가능한 느리게 한다.
 - (2) 정맥주사는 환자를 옆으로 눕히고 투여한다.

■ 포장단위: 1mL×10앰플/박스

■ 저장방법: 차광밀봉용기

■ 제조자/판매자: 일성신약㈜, 경기도 안산시 단원구 산단로 349

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알려십시오.

※ 사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리 기준)에 의하여 엄격한 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 www.ilsung-ph.co.kr이나 소비자 상담실(수신자 부담) 080-211-0003를 통해 확인할 수 있습니다.

ILSUNG 일성신약(주)
www.ilsung-ph.co.kr

최종 개정 연월일: 2016. 12. 09

