



전문의약품

중추성 근이완제

콘락스® 정 2밀리그램

(프리디닐메실산염)

■원료약품 및 그 분량: 1정 중

- 유효성분 : 프리디닐메실산염(KP) 2.0mg
- 첨가제(동물유래): 유당수화물(소, 유장)
- 기타 첨가제: 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 탬실드흰색(11W1306), 옥수수전분, 카르나우바납

■성상

흰색의 필름코팅정

■효능·효과

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연축 :요배통증, 경견완 증후군, 견관절 주위염, 변형성 척추증

■용법·용량

성인 : 프리디닐메실산염으로서 1회 4mg 1일 3회 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 늑내장 환자(항콜린작용에 의해 안압을 상승시킬 수 있다.)
- 3) 전립선비대에 의한 배뇨곤란 환자(항콜린작용에 의해 배뇨장애를 악화시킬 수 있다.)
- 4) 중증의 심질환 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 5) 마비성 장폐색증 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 6) 거대 결장증 환자
- 7) 급성 폐부종 환자
- 8) 빈맥 환자
- 9) 중증의 동맥경화증 환자
- 10) 위장관부위협착 환자
- 11) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 간·신장에 환자
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 과민증 : 발진, 두드러기, 드물게 아나필락시양 증상, 속유사증상 (주사제에 한함)이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 정신신경계 : 때때로 어지러움, 비틀거림, 실신, 졸음, 불안, 환각, 무력감, 컨태담 등이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
- 3) 골격근 : 드물게 근이완, 근무력증, 장시간 정좌불능 등이 나타날 수 있다.
- 4) 소화기계 : 식욕부진, 가슴쓰림, 위거복함, 위부불쾌감, 구갈, 때때로 구역, 구토, 설사, 심부부통, 위통 등이 나타날 수 있다.
- 5) 피부 : 한선분비감소, 홍반
- 6) 눈 : 시조절장애, 협우각형홍내장이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

졸음, 주의력, 집중력, 반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

- 1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 병용투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이하게 투여하는 경우에는 감량하는 등 주의한다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 바르비탈계 약물 등의 중추신경억제제, MAO 저해제
- 2) 다음 약물과의 병용에 의해 이 약의 항콜린작용이 증강될 수 있다. : 아만타딘, 퀴닌
- 3) 도파민길항제(메토클로프라미드 등)와 병용시 위장관 작용을 상해시킨다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 이 약은 모유중으로 이행하므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

7. 소아에 대한 투여

유·소아에 대한 안전성이 확립되어있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

■포장단위 : 500T/병

■저장방법 : 밀폐용기, 실온보관

■제조자/판매자 : 일성신약(주), 경기도 안산시 단원구 산단로 349 (B동제외, D동일부제외)

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알려십시오.

※ 사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리 기준)에 의하여 엄격한 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 www.ilsung-ph.co.kr 이나 소비자 상담실 02-3271-8800을 통해 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)에 의약품 부작용 신고 및 피해구제 상담을 할 수 있습니다.

최종 개정 연월일 : 2022.12.16