



1 5 2 3 9

I AGH 09

전문약품

분류번호:618

내성균용 광범위항생제

오구멘틴정

(아목시실린·클라불란산칼륨)

187.5mg
375mg
625mg

■ 원료약품 및 그 분량:1정 중

오구멘틴정 187.5mg	오구멘틴정 375mg	오구멘틴정 625mg
- 유효성분 : 아목시실린·클라불란산칼륨 (2:1)(KP) ······ 187.5mg(역가) -기타첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 에칠셀룰로오스, 오파스 프레이K-1-7000, 전분글리콜산나트륨, 프로필렌글리콜, 히프록셀로오스2910	- 유효성분 : 아목시실린·클라불란산칼륨 (2:1)(KP) ······ 375mg(역가) -기타첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 에칠셀룰로오스, 오파스 프레이K-1-7000, 전분글리콜산나트륨, 프로필렌글리콜, 히프록셀로오스2910	- 유효성분 : 아목시실린·클라불란산칼륨 (4:1)(KP) ······ 625mg(역가) -기타첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 에칠셀룰로오스, 오파스 프레이K-1-7000, 전분글리콜산나트륨, 프로필렌글리콜, 히프록셀로오스2910

■ 성상

오구멘틴정 187.5mg	오구멘틴정 375mg	오구멘틴정 625mg
백색 또는 거의 백색의 원형 필름코팅정제	백색이거나 거의 백색 타원형의 필름코팅정제	백색 또는 거의 백색의 타원형 필름코팅정제

■ 효능·효과

- 유효균종
 - *황색포도구균, *표피포도구균, 스트렙토кокус 피오게네스(그룹 A-베타용혈성), 패렴연쇄구균, 스트렙토кокус 비리dans, 엔테로кокус 파이칼리스, 코리네박테륨, 린저균, 리스테리아 모노사이토제나스, 클로스트리듐, 폐도구균, 폐도연쇄구균, *대장균, *프로테우스 미라빌리스, *프로테우스 볼가리스, *클레브시엘라, *실로넬라, *시젤라, 보르데텔라, 바일에, *에르시니아 엔테로콜리타가, 부루셀라, 수막염균, *임균, *모락셀라 카타리알리스, *인플루엔자균, 동물 파스퇴르균종 병원균, 공장감 필로라티, 콜레라균, *박테로이드(박테로이드스 크라질리아 포함)
- (암피실린 및 아목시실린에 내성이 있는 베타락타마제 생성균주 포함)
- 적응증
 - 급·만성 기관지염, 대염성 및 기관지 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염
 - 방광염, 요도염, 신우신염
 - 골반감염, 임질
 - 중기 및 농양, 연조직염, 상처감염
 - 골수염
 - 치과 감염

■ 용법·용량

- 성인 및 12세 이상 또는 체중 40Kg 이상 소아 : 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 250mg/125mg, 1일 3회 8시간마다 경구투여하여 중증 및 호흡기 감염 시 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 500mg/125mg으로 증량할 수 있다.
- 신장장애에 있는 경우 크레아티닌청소율에 따라 적절히 감량한다.

-성인:-		
	크레아티닌청소율	용법·용량
	10 ~ 30mL/min	아목시실린의 양으로서 1회 250 ~ 500mg을 12시간마다 경구투여한다.
	10mL/min 이하	아목시실린의 양으로서 1회 250mg을 24시간마다 투여하되 용량이 초과되지 않도록 한다.

- 소아: 같은 방법으로 감량한다.
- 단, 치과 감염 시는 아목시실린의 양으로서 1회 250mg, 1일 3회 5일간 투여한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약의 성분 또는 베타락탐계(페니실린계, 세페미계)에 과민반응(예, 아나필락시스, 피부점막만종증(스티븐스-존슨증후군), 쇼크 포함)의 병력이 있는 환자(베타락탐계 약물에 고차 과민반응의 우려가 있음)
 - 동반감염 바이러스 질환 특히 전염단핵구증 및 림프성백혈병 환자(발진위험이 증가할 수 있다.)
 - 이 약 또는 페니실린에 의한 황달 또는 간기능 장애의 병력이 있는 환자(재발할 수 있다.)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 간장애 환자(간기능장애가 악화될 수 있다.)
 - 중증도 또는 중증 신장애 환자(혈중농도가 지속되므로 투여간격을 두고 사용한다.)
 - 본인 또는 부모, 형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자
 - 경구 섭취가 불량한 환자, 비경구 투여양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있다.)
 - 구토 및 설사를 동반한 소화계 질환환자(약물의 충분한 흡수를 보장할 수 없다.)
- 이상반응
 - 소화기계: 설사, 위막성대장염, 소화불량, 구내염, 드물게 위염, 허염, 흑모설, 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 복통, 복부팽만감, 변비, 경장통, 위산증, 연변, 구강건조증 등이 나타날 수 있다. 또한 칸디다증, 항생물질로 인한 대장염(위막성대장염 및 출혈성 대장염 포함)이 드물게 보고되고 있다. 혈변을 동반한 중증의 대장염이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 드물지만 구역현상이 고용량 복용 시 나타나는 가장 보편적인 증상이다. 경구 투여로 발생하는 위장관계 이상반응은 식사 시작 시 이 약을 복용함으로써 감경될 수 있다.
 - 다른 항생물질과 마찬가지로 위장관계 이상반응 발현율은 2세 미만의 영아에서 상승할 수 있다. 그러나 임상 시험에서는 2세 미만 영아의 4%만이 치료를 중단하였다.
 - 간장: 때때로 AST, ALT, ALP, LDH, 혈청빌리루빈의 상승, 드물게 간염, 담즙울체성 황달이 나타날 수 있다. 이러한 증상은 다른 페니실린제보다 이 약을 사용하는 경우가 더 일반적으로 나타나고, 성인, 고령자(특히 60세 이상), 남성의 경우에 더 빈발한다고 보고되어 있다. 이상반응의 징후 및 증상은 치료 중 발현할 수 있지만 치료 중단 후 최대 6주까지 뒤늦게 보고되는 예가 많다. 간에 대한 이상반응은 대체로 가역적이거나 극히 드물게 사망 예가 보고되어 있다. 이들 사망 예는 일반적으로 심각한 지병을 앓고 있는 경우 또는 병용투여 약물과 관련되어 있었다. 간에 대한 이상반응은 남성 및 고령자에서 주로 보고되고 있으며 이 이상반응은 14일 이상 장기투여 시 더 증가된다. 간생검에 의한 조직학적인 관점에서 담즙울체성, 간세포성, 또는 담즙울체성 및 간세포성 혼합성 변화가 보였다. 특히 소아에게서도 드물게 보고되었다. 투여기간은 적응증에 따라 적절히 검토해야하며 검토없이 14일을 초과하지 않는다.
 - 과민반응: 드물게 가려움, 다형성출혈반, 피부점막만종후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사증후군(리절증후군), 수포성발진피부병 그리고 급성 전신발진성 농포증이 드물게 보고되고 있다. 이러한 피부반응은 항스타티민제나 필로 시 코르티코이드 전신투여로 조절가능하고, 이러한 발진 증상이 발현한 경우에는 투여를 중지하고, 의사의 지시를 따른다. 호산구증가와 전신증상을 동반한 약물반응(Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms(DRESS))이 보고되었다. 다른 베타락탐계 항생물질과 마찬가지로 드물게 혈관부종, 아나필락시스 혈청병양 증후군(혈청병양 이행 과민반응 (면역복합체질환)은 발열, 발진(특히 입 주위 피부발진, 두드러기, 마진양 발진), 관절통, 부종, 림프절증을 특징으로 한다.) 및 과민성 혈관염, 급성전신성 발진성표포증, 기관지경련을 동반한 호흡곤란, 후두부종, 아나필락시스 쇼크를 일으키는 혈안강화 증상 등이 보고되고 있다.
 - 혈액계: 다른 베타락탐계 항생물질과 같이 드물게 가역성 백혈구 감소(호중구 감소 및 과립구 결핍 포함), 가역성 혈소판 감소 및 용혈성 빈혈, 빈혈, 혈소판 감소성 자반, 호산구 증가, 백혈병, 무과립구증, 림프구 감소, 드물지만 경미한 혈소판 증가, 골수억제 등이 보고되고 있다. 또한 출혈시간 및 프로트롬빈시간이 연장이 드물게 보고되었다.
 - 비뇨기계: 결핵칸디다증을 비롯하여 질가려움·소라림, 분비물증가 등이 나타날 수 있다.
 - 중추신경계: 극히 드물게 중추신경계에 대한 이상반응이 확인된 바 있다. 그 이상반응으로는 초조감, 불안, 행동변화, 착란, 졸음, 불면, 가역성 활동 환진증, 어지럼, 드물게 두통 및 경련이 있다. 경련 증상은 신기능 손상이나 고용량 투여환자에서 발생할 수 있다. 항부(목부위)경직, 발열, 두통, 구역·구토 또는 의식 혼탁 등이 수반되는 무균성수막염이 나타날 수 있으므로 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 신장: 드물게 급성 신부전, 간질성 신염, 이와 관련된 혈뇨 등 중증 신장애가 나타날 수 있으므로 정기검사를 하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 균과대중: 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 비타민 결핍증: 구내염, 비타민 K 결핍증상(여포로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(하염, 구내염, 식욕부진, 신경병 등)이 나타날 수 있다.
 - 기타: 드물지만 이각이상, 관태강 등이 보고되었다.
 - 구내 시판 후 이상사례 보고자료(1989 ~ 2015년분)을 토대로 심리학적 분석·평가 결과 새로 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 피부 및 피하조직계: 피부병
 - 전신 및 투여부위 이상: 구강부종



4. 일반적 주의

- 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 페니실린을 투여한 환자에서 심각한, 때때로 치명적인 과민반응(아나필락시스모양 반응 및 중증피부반응 포함) 및 혈관부종이 나타날 수 있다. 이러한 반응은 페니실린 과민반응의 병력이 있거나 다발성 알레르기항원에 대해 감수성의 병력이 있는 환자에서 발생하기 쉬우며, 비경구적 요법에서 더 자주 발생하나 경구적 요법 시에도 발생할다.
- 아나필락시스 쇼크가 매우 드물게 나타날 수 있으므로 면밀히 모니터링하고 안정한 상태를 유지하도록 처치하여야 한다. 투여 후 환자를 안정한 상태로 유지시키고 충분한 관찰을 실시한다. 심각한 아나필락시스가 발생하는 경우에는 에피네프린과 같은 신속한 응급처치를 한다. 삽관용 포함된 산소, 코르티코이드의 정맥주사, 기도 확보 등의 처치를 의사의 지시에 따라 실시한다.
- 항생제의 사용과 관련하여 위막성 대장염이 경미한 수준에서 생명을 위협하는 수준까지 보고되었다. 따라서, 항생제 사용 중 또는 사용 후 설사가 발생한 환자에서 위막성 대장염이 고려되어야 한다. 장기간 또는 심각한 설사가 발생하거나, 환자에게 복부경련이 나타나면, 이 약의 사용을 즉시 중단하고 환자는 추가적으로 조사되어야 한다. 항생물질 사용에 의해 장내세균총이 변화를 일으켜 클로스트리듐의 과잉번식을 일으킬 수 있다. 연구에 의하면 클로스트리듐 다이피셀에 의해 생산되는 독소가 항생물질관련 대장염의 주 원인으로 알려졌다. 위막성대장염으로 진단이 내려지면 치료를 시작해야한다. 경미한 위막성대장염은 투약중지에 의해 회복될 수 있다. 중증도 또는 중증의 경우에는 수액, 전해질, 단백질보충 등의 처치를 하고 클로스트리듐 다이피셀에 대해 임상적으로 효과있는 항생물질로 치료한다.
- 장기 투여 시 때때로 비감수성균의 과잉 증식 등이 나타날 수 있으므로 14일 이상 투여할 경우에는 충분히 관찰한다.
- 일부 이 약 투여환자에서 간기능 검사 상 변동이 확인된 바 있다. 임상적 유의성은 불확실하나 간기능부전 징후가 있는 환자의 경우 주의하여 사용하여야 한다. 중증이나 대체로 가역적인 담즙 울체성 황달이 드물게 보고되고 있다. 치료중단 후 6주 경과 시까지 그 증상 및 징후가 외관상 발현하지 않을 수 있다.
- 이 약의 대부분은 신장으로 배설되므로 중증도 이상의 신장애에 환자의 경우 용법·용량 한도에 준하여 이 약사용량을 조정하여야 한다.
- 홍반성 발진은 아목시실린 사용으로 발생하는 전염단핵구증과 관련되므로 전염단핵구증이 우려되는 경우 이 약 사용을 피하여야 한다.
- 두드러기, 피부발진, 혈청병과 같은 증상이 나타나는 경우에는 약물투여를 중지하고 의사의 지시에 따라 적절한 처치를 한다.
- 이 약은 페니실린계 항생물질중에서는 비교적 낮은 독성을 나타내기는 하지만, 장기투약하는 경우에는 신기능, 간기능, 조혈기능 등에 대한 정기적인 관찰이 필요 하다.
- 이 약물로 치료를 시작하기 전에 페니실린, 세팔로스포린 또는 다른 알레르기 항원에 대한 이과민반응의 병력 등에 대한 문진이 필요하다.

5. 상호작용

- 프로베네시드와의 병용 투여는 바람직하지 않다. 이는 아목시실린의 신세노곤 배설을 감소시킴으로써 아목시실린의 혈중농도가 상승 지속될 수 있으며 클라불란산은 무관하다.
- 알로푸리놀과 암피실린을 병용 투여할 경우에는 암피실린을 단독 투여한 환자에 비해 알레르기성 피부반응(발진) 발생 가능성이 높으나 알로푸리놀에 의한 것인지고 노심환술에 의한 것인지는 확실하지 않다.
- 디알피람과 병용투여하지 않는다.
- 이 약 투여환자 일부에서 출혈시간 및 프로트롬빈 시간 연장이 보고되었으므로 항응고요법 중인 환자의 경우에는 신중히 투여한다.
- 장내세균총에 영향을 주어 경구위약의 효과를 떨어뜨릴 수 있으므로 환자에게 주의를 시킨다.
- 아세틸살리실산, 메날부타존 및 다량의 항응고제를 페니실린과 동시 투약하면 혈중농도가 증가된다.
- 테트라사이클린계, 마크로라이드계, 설폰아미드계, 클로람페니콜계를 포함한 경우용 화약요법 항생물질과의 병용투여 시 길항작용이 일어난다.
- 설파살라진과 동시 투여 시 설파살라진의 혈장농도를 감소시킨다.
- 아목시실린은 메토트렉세이트의 신장 청소율을 떨어뜨린다.
- INR(국제감청정상비율)의 변화: 이 약을 포함한 항생물질은 항응고제와 동시에 투여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고되었다. 감염성질환(그리고 열중성 질환을 동반한), 환자의 연령과 일반적인 상태는 위험요소가 된다. 비록 이 약과 와파린의 상호작용이 임상작용이 임상작용이 없었지만 INR 모니터링을 실시하여야 하고, 필요한 경우 경구용 항응고제의 용량을 적절히 조절한다. 항생물질의 일부 종류를 특히 플루오퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 테트라독사솔과 일부 세팔로스포린의 경우는 더 심하다.
- 항생물질 사용이 장내세균총에 영향을 끼쳐 일부 환자에서는 감שמ배양제(디코신 등)의 흡수가 증가될 수 있다.
- 미코페놀레이트포말을 투여하는 환자가 경구 아목시실린/클라불란산칼륨을 병용한 직후, 수일동안 미코페놀산의 최저혈중농도(pre-dose, trough)가 약 50% 로 감소한 사례가 보고되었다. 투여를 지속함에 따라 이러한 현상이 감소되었으며 투여 중단 후에는 소실되었다. 최저혈중농도 변화가 미코페놀산 노출도의 변화를 정확히 반영한다고 볼 수 없으므로 이러한 현상에 대한 임상적 유의성은 분명하지 않다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 동물시험에서 기형발생작용은 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하여 특히 임신 초기 3개월 동안은 투여하지 않는다.
- 수유 중 미량의 페니실린(암피실린 포함)이 모유로 이행될 수 있다.
- 수유부에 대한 투여로 인해 영아에게 설사, 점막의 진균서식, 과민반응 발현(피부발진 등)의 위험이 나타날 수 있으므로 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

7. 소아에 대한 투여: 투여대상(12세 이상 또는 체중 40kg 이상 소아) 외의 소아에게 권장하지 않는다.(사용경험이 적다.)

8. 고령자에 대한 투여

고령자에는 다음과 같은 점에 주의하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

- 생리기능이 저하되어 있는 경우가 많기때문에 이상반응이 나타나기 쉽다.
- 비타민 K 결핍에 의한 출혈경향이 나타날 수 있다.

9. 임상검사치에의 영향

- 이 약은 요중으로 다량 배설되어 고농도의 요중 암피실린은 베네딕트 시약 펠링시약, 클리네테스트에 의한 요당검사에서 거짓양성이 나타날 수 있으므로 주의한다. 따라서 환자에게 이 약을 투여하는 동안 이러한 검사를 실시하는 것은 바람직하지 않다. 테스태이프시합은 이 약에 의해 영향을 받지 않는다.
- 임부에게 암피실린 투여 시에 혈장내의 총 결합형 에스트라디올, 에스트라디올 글루코코나이드, 결합형 에스트론 및 에스트라디올 농도가 일시적으로 감소됨이 관찰 되었다. 이러한 결과는 아목시실린 및 이 약 투여시에도 관찰되었다.
- 유로빌리노겐 검사에도 영향을 나타낼 수 있다.
- 클라불란산은 철구각의 표면에 흡수되는 경향이 있다. 만약 약물에 대한 함체가 존재한다면 콤스시험 양성의 결과를 나타낼 수 있다.
- 아목시실린 고농도 투여 시에 다음과 같은 경향이 있으므로 주의한다.: 유색반응으로 혈청의 총단백질비율을 결정하는데 간섭한다.

10. 과량투여시의 처치

- 중상
 - 과량투여에 의한 문제는 거의 발생하지 않으나 발생하는 경우에는 소화기증상(위통 및 복통, 설사, 구토 등) 및 체액과 전해질 평형이상, 소수의 경우에는 발진, 활동불편증, 졸음이 나타날 수 있다.
 - 아목시실린 과량투여 시 드물게 소변감소성 신부전으로 인한 간질성신염이 보고되기도 한다. 신부전증상은 이 약의 투여를 중지하면 가역적으로 회복되기도 한다. 아목시실린 및 클라불란산칼륨의 신장청소율을 감소로 인해 신부전환자는 높은 혈중농도를 유지하게 된다.
 - 페니실린을 고용량 투여하는 경우에는 간질성 뇌경련이 일어날 수 있다. 페니실린을 투여 받은 환자에서 중독증상은 아니지만 자주 일어날 수 있는 현상은 과민성 쇼크이다. 드물지만 급성이면서 치명적일 수 있다. 일반적으로 투여 직후 30분 안에 나타날 수 있다. 즉시 모든 가능한 처치를 실시하여 혈액순환을 정상화 시켜야 한다.
 - 피부반응, 출혈, 범세포 감소 등 기타의 알레르기 반응도 일어날 수 있다.
 - 치치: 이러한 경우에는 즉시 투여를 중지하고 중상에 따른 수분 전해질 평형에 주의하면서 처치한다. 이 약은 혈액투석으로 제거될 수 있다. 만약 과량투여사태가 발생한 지 얼마 지나지 않았고, 구기투여의 대상이 아니라면 구토 또는 위내용물 제거를 위한 다른 방법도 실시가능하다. 과량투여로 인한 경련이 있을 경우에는 디아제팜으로 진정시킨다.
- 보통 및 취급상의 주의사항: 25℃이하 건조한 곳에 보관한다.
- 기타
 - 타이마의 조기파열 여상에 대해 예방의 목적으로 이 약을 투여하는 것이 신생아에게 과사성 소장결장염 발생 위험의 증가와 관련이 있다고 추정되는 한 건의 연구 사례가 있다. 만약 다른 약물과 마찬가지로 의사에 의해 필요한 것으로 판단되지 않으면 이 약의 사용은 피해야한다.

- **취급 및 조제 시 주의사항:** 본 제품은 인습성이 있어 외관상 제품의 변형이 발생할 우려가 있으므로 보관 및 조제 시 유의하여야 하고, 조제 시 PTP상태로, 분할 또는 분쇄하지 마시고 투약하여 주시기 바랍니다.
- **포장단위:** 오구멘틴정 187.5mg·90정(15정/PTP×6)
오구멘틴정 375mg·100정(10정/PTP×10)
오구멘틴정 625mg·100정(10정/PTP×10)
- **저장방법:** 1~25℃보관, 기밀용기(방습포장), 건조보관
- **제조자/판매자:** 일성신약(주), 경기도 안산시 단원구 산단로 349

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에에는 사용하지 마십시오.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- ※ 첨부문서 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알려십시오.
- ※ 사용(유지)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 본 의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리 기준)에 의하여 엄격한 관리를 필한 제품입니다.
- ※ 만약 구입 시 사용(유지)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품이 발견되면 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 www.itsung-ph.co.kr이나 소비자 상담실(수신자 부름) 080-211-0003를 통해 확인할 수 있습니다.

최종 개정 연월일 : 2018.01.01

제조자/판매자
일성신약(주)
www.itsung-ph.co.kr

원료공급/기술제휴/Copromoted by
GlaxoSmithKline

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies. ©2017 GSK group of companies or its licensors.
본 상표는 GSK그룹사 소유이거나 실시권을 부여 받은 것입니다. ©2017 GSK그룹사 또는 실시권자

