



분류번호: 331

전문약품

씨제이 5%포도당생리식염주사액 5% Dextrose & Sodium Chloride Inj.

●원료약품 및 그 분량 이 약 1,000밀리리터 중

주성분 : 포도당(무염).....	50그램
염화나트륨(약전).....	9그램
용제 : 주사용수(약전).....	적량

●성상

외부를 반투명의 고밀도 폴리에틸렌으로 포장한 무색투명한 수액용 플라스틱 용기에 충전된 무색투명한 수액용 주사제

●효능·효과

1. 말수증, 수술전후 등의 수분· 전해질 보급
2. 에너지 보급

●용법·용량

보통 성인 1일 500~1,000mL를 2~3회 나누어 점적 정맥주사한다. 투여속도는 시간당 250~500mL(분당 60~120방울)이고, 영·유아의 경우 시간당 15~60mL(분당 4~15방울), 고령자의 경우 시간당 250mL (분당 60방울)로 한다. 투여량, 투여속도는 연령, 체중, 증상에 따라 적절히 증감한다.

●사용상의 주의사항

1.경고

포도당 함유제제를 정맥주사하는 환자는 차아민(비타민B₁₂) 소모율이 높기때문에 순환적으로 치명적인 차아민 결핍을 초래할 가능성이 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 수분과다상태 환자
- 2) 저장성 말수증 환자
- 3) 저칼륨혈증 환자
- 4) 고나트륨혈증 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 신질환에서 기인한 신부전 환자
- 2) 심부전 환자
- 3) 고장성 말수증 환자
- 4) 폐쇄성 요로질환에 의한 요량감소가 있는 환자
- 5) 당뇨병 환자
- 6) 고염소혈증 환자
- 7) 저나트륨혈증(120 mmol/L 미만) 환자

4. 이상반응

- 1) 대량·급속투여에 의해 뇌부종, 폐부종, 말초부종, 산증, 수종독이 나타날 수 있다.
- 2) 신생아, 미숙아에 급속투여(시간당 100mL 이상)하는 경우 수종독이 나타날 수 있다.
- 3) 주입정맥에서 혈전증이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
- 혈당, 혈청 전해질, 체액 평형을 정기적으로 모니터링해야 한다.
6. 임부, 수유부, 가임여성, 신생아, 유아, 소아, 고령자에 대한 투여
- 1) 유아 및 고령자에게는 급속 또는 장시간 투여해서는 안된다.
- 2) 고령자에 투여시 특히 중증 심부전 및 신부전 환자에게는 순환과 부하를 피하기 위해 주의하여 투여하여야 한다.

7. 과량투여시의 처치

이노제를 투여하여야 한다.

8. 적응상의 주의

- 1) 투여전
- (1) 투여전에 감염에 대한 처치를 한다 (환자의 피부나 기구 소독).
- (2) 한병기에는 체온정도로 따뜻하게 하여 사용한다.
- (3) 개봉 후 즉시 사용하고, 잔액은 사용하지 않는다.
- 2) 투여시 천천히 정맥주사한다.
9. 보관 및 취급상의 주의사항
- 실온에서 보관한다.

●저장방법 밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

●표장단위 500, 1000밀리리터

* 본 제품은 '우수약품 제조관리 기준(KGMP)'에 따라 제조 및 품질관리를 필한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나, 변질·변패, 오염 되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 문의하실 사항이 있으신 분은 아래의 전화로 연락바랍니다.

* 수액세트 스파이크 삽입 또는 약물 추가 혼주시 고무전 파편이 생길 우려가 있으므로 주의가 필요 합니다.

* 오버 파우치 제거후 즉시 사용을 권장합니다.

* 육안으로 보이는 이물이 있거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.

* 냉동 및 가열 금지

* 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.

* 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>)→(의약품유해사례보고)에 알려십시오.

* 이 첨부문서 개정일자(2014년 05월 01일) 이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr>에서 확인할 수 있습니다.

설명서 작성연월일:910226


설명서 개정연월일:140501

제조사 : 씨제이헬스케어주식회사


충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

고객행복센터 : 080-700-8802

Safe-Flex® 용기의 사용방법




1



2

Safe-Flex 용기의 윗부분을 완손으로 고정시킨 다음, 오른손 엄지로 갈라진 부분을 잡고 오른팔을 아래쪽으로 밀어 내리면서 (몸과 수직방향) 걸고장을 제거합니다.

제품의 이상여부를 확인한 다음, 약제를 추가하는 경우에는 노란 고무막으로 덮여있는 입구에 19~22gauge 주사 바늘을 사용하여 약제를 주입하며 5~6회 주입해도 무방합니다.




3

푸른색 보호막을 밀어 져서서 제거합니다.




4

수액세트의 스파이크를 우측으로 돌리면서 삽입합니다.



5



6

주입중 눈금을 확인하는 경우에는 정면에서 눈금을 읽을 수 있으며 이 경우 오차의 범위는 ±5% 이내입니다.

주입이 종료된 후에는 빈 용기를 소각하거나 수거박스에 넣어 수거업체가 하수도로 합니다.