



분류번호: 323

전문 의약품

씨제이 5% 과당 주사액 5% Fructose Inj.

● 원료약품 및 그 분량

이 약 1,000밀리리터 중

주성분 : 과당(약전) 50그램

용 제 : 주사용수(약전) 적량

● 성상

무색투명한 수액용 플라스틱용기에 충전된 무색 또는 미황색의 투명한 수액용 주사제

● 효능 · 효과

1. 당뇨병 및 당뇨병 상태의 에너지 보급
2. 약물중독, 알콜중독
3. 기타 비경구적으로 수분 · 에너지 보급을 필요로 하는 경우
4. 주사제의 용해화학적제

● 용법 · 용량

- 성인 : 과당으로서 1회 500~1000 mL 정맥주사한다.
- 점적정맥주사 속도는 시간당 0.5 g/체중 kg 이하로 한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 유전성 과당불내증 환자
 - 2) 저장성 탈수증 환자
 - 3) 메칠알코올 중독 환자
 - 4) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 요붕증 환자
 - 2) 과당뇨증(fructosuria) 환자

- 3) 고노산혈증 환자
 - 4) 후각과민반응
 - 5) 속산태
 - 6) 간 · 신질환 환자
3. 이상반응
- 1) 대량투여로 인한, 홍조가 나타날 수 있다.
 - 2) 대량급속투여에 의해 전해질 상실을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
4. 고령자에 대한 투여
- 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 신중히 투여한다.
5. 적응상의 주의
- 1) 피하대량투여에 의해 혈장으로부터 전해질이 이동해서 순환부전을 초래할 수 있으므로 피하주사하지 않는다.
 - 2) 투여전 : 투여하기 직전에 감염에 대한 주의를 한다 (환자의 피부나 기구소독). 한병기의 경우 체온 정도로 따뜻하게 하여 사용한다. 개봉한 후에는 곧바로 사용하고 잔액은 사용하지 않는다.
- 3) 투여시
- 천천히 정맥내 투여한다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
- 포장 내 물방울이 있거나 용액이 착색 또는 혼탁되어 있는 것은 사용하지 않는다.
7. 기타
- 과당의 대량 급속투여에 의해 젖산산증, 고노산혈증, 혈전 성정맥염, 흉부나 위부의 불쾌감, 통증이 나타났다는 보고가 있다.

● 저장방법 밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

● 포장단위 500, 1000밀리리터

- * 본 제품은 '우수의약품 제조관리 기준(KGMP)'에 따라 제조 및 품질관리를 필한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나, 변질 · 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 문의하실 사항이 있으신 분은 아래의 전화로 연락바랍니다.
- * 수액세트 스파이크 삽입 또는 약물 추가 혼주시 고무전 파편이 생길 우려가 있으므로 주의가 필요합니다.
- * 오버 파우치 제거후 즉시 사용을 권장합니다.
- * 육안으로 보이는 이물이 있거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.
- * 냉동 및 가열 금지
- * 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) → (의약품유해사례보고)에 알려십시오.
- * 이 첨부문서 개정일자(2014년 05월 01일) 이후 변경된 내용은 <http://www.cjcp.co.kr>에서 확인할 수 있습니다.

설명서 작성연월일: 910226


설명서 개정연월일: 140501

제조사 : 씨제이헬스케어주식회사

충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20


고객행복센터 : 080-700-8802

■ Safe-Flex® 용기의 사용방법




Safe-Flex 용기의 윗부분을 완손으로 고정시킨 다음, 오른쪽 엄지손가락 끝부분을 잡고 오른쪽을 아래쪽으로 밀어 내리면서 (몸과 수직방향) 걸조장을 제거합니다.

제품의 이상여부를 확인한 다음, 약제를 추가하는 경우에는 노란 고무막으로 덮여있는 입구에 19~22gauge 주사 바늘을 사용하여 약제를 주입하며 5~6회 주입해도 무방합니다.



푸른색 보호막을 밀어 찾아서 제거합니다.

수액세트의 스파이크를 우측으로 돌리면서 삽입합니다.



주입중 눈금을 확인하는 경우에는 정면에서 눈금을 읽을 수 있으며 이 경우 오차의 범위는 $\pm 5\%$ 이내입니다.

주입이 종료된 후에는 빈 용기를 소각하거나 수거함에 넣어 수거업자가 회수하도록 합니다.