

씨제이 주사용수

Water for Inj.

●원료약품 및 그 분량

이 약 1,000밀리리터 중
주사용수(약전) 1,000밀리리터

●성상

외부를 반투명의 고밀도폴리에틸렌으로 포장한 무색투명한 수액용 플라스틱 용기에 충전된 무색투명한 주사용 용제

●효능·효과

점안제, 주입제 시약등의 조제나 약품제조에 사용

●용법·용량

용해제로 적량을 사용한다.

●사용상의 주의사항

- 1) 본품 자체를 주사하지 말 것.
- 2) 확대하지 않고 육안으로 쉽게 알아볼 수 있는 혼탁물이나 불용성 물질이 있으면 사용하지 말 것.

●저장방법

밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

●포장단위 100, 500, 1000밀리리터

* 본 제품은 '우수의약품 제조관리 기준(KGMP)'에 따라 제조 및 품질관리를 필한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나, 변질·변패, 오염 되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 문의하실 사항이 있으신 분은 아래의 전화로 연락바랍니다.

* 수액세트 스파이크 삽입 또는 약물 추가 혼주시 고루전 파편이 생길 우려가 있으므로 주의가 필요합니다.

* 오버 파우치 제거후 즉시 사용을 권장합니다.

* 육안으로 보이는 이물이 있거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.

* 냉동 및 가열 금지

* 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.

* 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) → (의약품유해사례보고)에 알려십시오.

* 이 첨부문서 개정일자(2014년 05월 01일) 이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr>에서 확인할 수 있습니다.

설명서 작성연월일: 070410


설명서 개정연월일: 140501

제조사 : 씨제이헬스케어주식회사


충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

고객행복센터 : 080-700-8802


Safe-Flex® 용기의 사용방법



Safe-Flex 용기의 뒷부분을 왼손으로 고정시킨 다음, 오른손 엄지로 갈라진 부분을 잡고 오른팔을 아래쪽으로 밀어 내리면서 (몸과 수직방향) 결포장을 제거합니다.




제품의 이상여부를 확인한 다음, 약제를 추가하는 경우에는 노란 고무막으로 덮혀있는 입구에 19~22gauge 주사바늘을 사용하여 약제를 주입하며 5~6회 주입해도 무방합니다.




푸른색 보호막을 밀어 젖혀서 제거합니다.



수액세트의 스파이크를 우측으로 돌리면서 삽입합니다.



주입중 눈금을 확인하는 경우에는 정면에서 눈금을 읽을 수 있으며 이 경우 오차의 범위는 ±5% 이내 입니다.



주입이 종료된 후에는 빈 용기를 소각하거나 수거박스에 넣어 수거업체가 회수토록 합니다.