



분류번호: 331

전문의약품

씨제이 디에스엘1:2:3주사액

●원료약품 및 그 분량

이 약 1,000밀리리터 중	
주성분:포도당일수화물(유에스피)	27.5그램
(포도당무수물로서	25.0그램)
염화나트륨(약전)	3.0그램
(염소로서	1.82그램)
락트산나트륨액50%(유에스피)	6.4그램
(락트산으로서	2.54그램)
pH조절제:염산(약전)	적량
용 제:주사용수(약전)	적량

●성상

무색투명한 수액용 플라스틱용기에 충전된 무색 또는 미황색의 투명한 수액용 주사제.

●효능·효과

1. 탈수증, 수술전후 등의 수분· 전해질 보급
2. 에너지 보급

●용법·용량

보통 성인 1회 500~1,000mL를 정적 정맥주사한다.
투여속도는 시간당 300~500mL(분당 75~120방울)이고, 소아의 경우 시간당 50~100mL로 한다.
투여량, 투여속도는 연령, 체중, 증상에 따라 적절히 증감한다.

●사용상의 주의사항

1.경고

포도당 함유제제를 정맥주사하는 환자는 치아민(비타민B1) 소모율이 높기때문에 순간적으로 치명적인 치아민 결핍을 초래할 가능성이 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 첫산혈증 환자
- 2) 수분과다상태 환자

- 3) 저장성 탈수증 환자
- 4) 저칼륨혈증 환자
- 5) 고나트륨혈증 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
- 1) 신질환에서 기인한 신부전 환자
- 2) 심부전 환자
- 3) 당뇨병 환자
- 4) 폐쇄성 요로질환에 의한 요관강사가 있는 환자
- 5) 중증 간장애 환자
- 6) 저나트륨혈증(120 mmol/L 미만) 환자

4. 이상반응
대량,급속투여에 의해 뇌부종, 폐부종, 말초부종이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의
혈당, 혈장 전해질, 혈액 평형을 정기적으로 모니터링해야 한다.

6. 적응상의 주의
완전히 맑지 않은 것은 사용하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항
실온에서 보관한다.

- 저장방법 밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

- 처방된증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마세요

- 포장단위 100, 250, 500, 1000밀리리터

* 본 제품은 '우수약품 제조관리 기준(KGMP)' 에 따라 제조 및 품질관리를 위한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효 기한이 경과되었거나, 변질·변패, 오염 되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 수액세트 스파이크 삽입 또는 약물 추가 혼주시 고무전 파편이 생길 우려가 있으므로 주의가 필요합니다.

* 오버 파우치 제거후 즉시 사용을 권장합니다.

* 육안으로 보이는 이물이 있거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.

* 냉동 및 가열 금지

* 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.


* 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) 또는 (의약품유해사례보고)에 알려십시오.

* 이 첨부문서 개정일자(2014년 05월 01일) 이후 변경된 내용은 (<http://www.cjp.co.kr>)에서 확인할 수 있습니다.


설명서 작성년월일:090722
설명서 개정년월일:140501

제조사 : **씨제이헬스케어주식회사**
충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20
고객행복센터 : 080-700-8802


Safe-Flex® 용기의 사용방법



Safe-Flex 용기의 윗부분을 완으로 고정시킨 다음, 오른손 엄지로 걸라진 부분을 잡고 오른팔을 아래쪽으로 밀어 내리면서 (몸과 수직방향) 걸조판을 제거합니다.



수액세트의 스파이크를 우측으로 돌리면서 삽입합니다.



주입중 눈금을 확인하는 경우에는 정면에서 눈금을 읽을 수 있으며 이 경우 오차의 범위는 ±5% 이내입니다.

주입이 종료된 후에는 빈 용기를 소각하거나 수거박스에 넣어 수거업자가 회수토록 합니다.