

복합제산제

아네모[®] 정

ANEMO Tablet

일반의약품

분류번호 234

KGMP

적격업체제품

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

건조수산화알루미늄겔(KP)	90mg
탄산수소나트륨(KP)	90mg
침강탄산칼슘(KP)	40mg
탄산마그네슘(KP)	25mg
스코폴리아엑스10배산(KP)	37.5mg

■ 성상

백색의 원형 필름제피정

■ 작용

1. 과잉분비된 위산을 중화시켜주고, 산의 분비를 억제하며, 산과 다른 인한 위부불쾌감, 신트림 등의 증상을 완화시켜 줍니다. 또한 과음후의 속쓰림에도 효과를 나타냅니다.
2. 위장의 기능을 활성화시켜 위장관 기능부전에 의한 식체에 효과를 나타내고 저하된 식욕을 높여주어 줍니다.
3. 소화성 궤양의 주된 병인인 위산을 중화시켜 줄 뿐 아니라 손상된 궤양면을 회복하여 위점막을 보호하여 궤양의 치유를 촉진시켜 줍니다.
4. 위장의 평활근 경련을 완화하여 위경련 통증 뿐 아니라 소화성 궤양으로 인한 동증도 진정시켜 줍니다.

■ 효능·효과

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림

■ 용법·용량

성인 1회 2정 1일 3회 식간(식사와 식사때 사이) 및 취침시에 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 투석요법을 받고 있는 환자
 - 2) 수유부(모유로 이행해서 젖먹이의 맥박이 빨라질 수 있다)
 - 3) 만 7세 이하의 어린이
 - 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당 분해효소 결핍증(Lapp Lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 위장진통·진경제
 - 2) 테트라사이클린계 항생제
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타나는 사람.
 - 2) 신장장애환자
 - 3) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

- 5) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타날 경우
 - 2) 이 약을 복용하는 동안 두물레 입이 마르는 증상이 나타날 경우
 - 3) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
 - 4) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 나트륨 제한 식이를 하는 사람
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 밀폐용기

■ 포장단위 : 10, 100, 200, 1000정

※ 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. PTP의 경우, PTP 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 정제에 포장 물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.
 3. 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2016년 10월 21일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)또는 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

10016

AMT-03-15-1171

SAMJIN

제조판매원

삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 외우신로 121 (서교동)

공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/2