

식욕부진 · 성장부진에 트레스탄[®] 캡슐

KGMP
적격업체제품

일반의약품
분류번호 119

■ 원료약품의 분량 : 1캡슐 중

유효성분 : 시프로헨타딘오트산염수화물(KP)	1.5mg
DL-카르니틴염산염(KP)	150mg
L-리신염산염(KP)	150mg
시아노코발라민(KP)	1mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호

기타첨가제 : 무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 메타규산알루미늄산마그네슘, 상 · 하부 적색의 경질캡슐제, 스테아르산마그네슘

■ **성상** : 연한 분홍색 가루가 충전된 상하부 적색의 경질캡슐제

■ **효능 · 효과** : 식욕부진, 성장부진

■ 용법 · 용량

성 인 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 아침 · 저녁 식전에 8일간 복용, 이후 부터는 1일 2회, 1회 2캡슐을 아침 · 저녁 식전에 복용
 소아(7~12세) : 1일 1회, 1캡슐을 저녁 식전에 8일간 복용, 이후부터는 1일 2회, 1회 1캡슐을 아침 · 저녁 식전에 복용
 소아(3~6세) : 1일 1회, 1/2캡슐을 저녁 식전에 8일간 복용, 이후부터는 1일 2회, 1회 1/2캡슐을 복용

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 녹내장 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
 - 3) 요저류(소변의 고임)의 소인이 있는 환자
 - 4) 고령자(노인) 및 쇠약자
 - 5) 신생아
- 다음 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 1) 항콜린작용이 있으므로 노내장질환자나 요폐(소변축적)를 일으킬 수 있는 환자는 주의를 한다.
 - 2) 과염소성 혈증성 산증(hyperchloremic acidosis)
 - 3) 신부전 환자
 - 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 어지러움, 구역, 발진, 권태감, 정신적 혼란, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 대량 투여 시는 운동실조, 다혈구혈증, 혈장칼륨 농도저하, 두드러기, 여드름 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 과민성 환자에서는 졸음이 올 수 있다.
 - 4) 드물게 두통, 구갈(목마름)이 나타날 수 있다.
 - 5) 대사성 산증이 나타날 수 있다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 운전 · 기계조작 시 주의한다.
 - 2) 상호작용
 - MAO 저해제(억제제) 및 알콜 등 및 기타 중추신경억제제의 효과를 증가시킬 수 있으므로 병용(함께 사용)투여하지 않는다.

■ **저장방법** : 차광기밀용기

■ **포장단위** : 60캡슐, 100캡슐

※ 주의

1. 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
2. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.
3. 의사 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
4. 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 모란 개정일자(2017년 09월 07일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)또는 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

09017
TRC-03-23-1171

제조판매원

SAMJIN **삼진제약주식회사**

본 사 : 서울특별시 마포구 외우리로 121 (서교동)

공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6