

콧물과 코막힘

페리나TM 정

PERINATM Tablet

KGMP 일반의약품
 적격업체제품 분류번호 141

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

수도아페드린염산염(USP) 25mg
 클로르페니라민말레산염(KP) 4mg

■ 성 상

흰색의 원형 정제

■ 약리작용

- 비강(코안)총혈체가 및 기관지확장작용에 의해 호흡을 용이하게(쉽게) 합니다.
- 혈관수축 및 교감신경에 작용하여 호흡기 점막총혈에 효과적입니다.
- 항 choline 및 진정작용을 나타내며 히스타민 및 히스타민양 물질에 대하여 길항작용(억제작용)을 나타냅니다.
- 기관의 분비를 감소시킵니다.

■ 효능 · 효과

감기 또는 알레르기성 및 혈관운동성 비염(코염)에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물

■ 용법 · 용량

성인 1회 1정, 1일 3회 식후에 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 전식, 녹내장, 고혈압, 심질환, 관상동맥(심장동맥)질환, 당뇨병, 갑상선기능항진증, 전립선(전립샘)비대로 인한 배뇨장애 및 7세 이하의 소아에게는 투여하지 않는 것이 바람직하나 반드시 필요한 경우에는 약사 또는 의사의 지시에 따라 투여한다.
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
3. 부작용
 - 1) 졸음, 일과성(한번 나타나고 없어지는) 자극통, 구갈(목마름), 구역, 불안, 발한(땀이 남) 및 약간의 혈압강하 등을 일으킬 수 있다.
 - 2) 과량투여시 급성중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면 등을 일으킬 수 있으므로 권장량 이상을 초과하지 않는다.
 - 3) 소아에게는 특히 흥분이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 이 약을 투여하는 동안 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
 - 2) 이 약의 투여중에는 알코올성 음료를 피한다.
 - 3) 사고로 과량투여시에는 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 4) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 연용(계속 복용)전에 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 5) 7세 이하의 소아에게는 필요한 경우 시럽제를 투여하되 용법 · 용량을 잘 지키고 표시된 연령(나이)외의 소아에게는 투여하지 않는다.
5. 상호작용

다음 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다 : 혈압강화제, 알코올, 중추 신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO 저해제(억제제) 등의 항우울제

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아) 하여 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

■ 저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위

10정(PTP), 300정(병)

※ 주의

1. 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
2. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.
3. PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으나 복용시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리 기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2017년 01월18일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자상담실(수신자부담전화 080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.

02017
 PAT-03-17-1171

제조판매원
SAMJIN **삼진제약주식회사**

본 사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)
 공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52
 ☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6