

항전간제

삼진 페니토인나트륨 주사 100mg, 250mg

SAMJIN Phenytoin Sodium inj.

■원료약품의 분량

- 1앰플(2mL) 중 페니토인나트륨(USP)..... 100mg
- 1앰플(5mL) 중 페니토인나트륨(USP)..... 250mg
- 100mg
- 첨가제 : 에탄올(안정제) 0.2mL, 프로필렌글리콜(용해보조제) · 용제 : 주사용수
- 250mg
- 첨가제 : 에탄올(안정제) 0.5mL, 프로필렌글리콜(용해보조제) · 용제 : 주사용수

■성상

무색투명한 액이 충전된 갈색 앰플제

■효능 · 효과

- 1.간질증진상제
2. 경구투여로 발작의 억제가 불가능한 경우(특히 의식장애, 수술후 · 수술후)
3. 1차라인 치료가 효과적이지 않은 디기탈리스로 유도된 심부정맥

■용법 · 용량

1. 간질증진상제, 경구투여로 발작의 억제가 곤란한 경우
성인 : 페니토인나트륨으로서 125~250 mg을 50 mg/min을 넘지 않는 속도로 천천히 정맥주사한다. 이상의 용량으로 발작을 억제할 수 없을 때에는 30분 후에 이 약으로서 100~150 mg을 추가로 투여하거나 다른 치료를 고려한다.
이 약의 투여에 의해 경련이 소실해 의식이 회복되면 경구투여로 전환한다.
2. 1차라인 치료가 효과적이지 않은 디기탈리스로 유도된 심부정맥
성인 : 시작용량으로서 페니토인나트륨으로서 체중 kg당 3.5~5 mg을 정맥주사한다. 필요시 1회 반복한다. 이 약은 50 mg/min을 넘지 않는 일정한 속도로 천천히 정맥주사 해야 한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 경고
- 1) 자살충동과 자살행동
(1) 항간질약을 복용한 환자에서 자살충동 또는 자살행동을 보이는 위험성이 증가되므로 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화에 대하여 모니터링되어야 한다.
(2) 항간질약을 처방받는 간질과 다른 많은 질병은 그 자체가 이환 및 사망, 치료가긴 동안의 자살충동과 자살행동의 위험성증가와 관련된다. 따라서, 처방자는 항간질약 처방시 환자의 치료가긴 동안 자살충동 또는 자살행동과 치료될 질병간의 연관성 유무 및 이 약의 유효성을 함께 고려한다.
- 2) 국소 이상증(Purple Glove 증후군 포함)(주사제에 한함)
주사 부위에 연조직 자극 및 염증반응이 나타날 수 있으며 혈관박출이 발생할 수 있다. 페니토인의 말초 정맥주사 후 Purple Glove 증후군(부종, 피부변색 및 주사부위 권위부 통증 등)이 보고되었다. 연조직 자극은 가벼운 압통부터 광범위한 괴사 및 피부발락 등 다양한 형태가 나타난다. 주사 후 수일 경과 후에도 증후군이 나타나지 않을 수도 있다. 증상은 자연적으로 해소되기도 하나, 피부괴사 및 사지 허혈이 나타나는 경우 근막절개술, 피부 이식, 드물게는 절단술 등의 치료가 필요 할 수도 있다.
국소 독성의 위험으로 인해 페니토인 주사제는 투여에 국한된 카테터를 통하여 말초의 넓은 정맥 또는 중심정맥을 통하여 직접 주입하여야 한다. 부위에 앞서 멸균 식염수를 흘려보내 IV 카테터의 개방성을 확인하여야 하며, 그 후 같은 카테터를 사용하여 주입함으로써 용액의 일괄리도에 의한 국소 정맥 약증을 피하도록 한다.
이 약을 근육주사하는 경우 주사부위에 통증, 괴사 및 농양 등이 발생할 수 있다.
2. 다음 환자(경우에는 투여하지 말 것)
1) 이 약, 히단토인계 화합물 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
2) 중증의 혈액 및 골수장애 환자
3) 방실블록(2, 3도) 환자
4) 심근경색(3개월 이내) 환자
5) 타다라필을 투여 중인 환자(타다라필의 대사가 촉진되어 혈중농도가 저하될 수 있다.)
6) 애덤스-스톡스 증후군 환자(주사제에 한함.)
7) 동시맥, 동방블록 환자(주사제에 한함.)
8) 델라베르딘과의 병용 투여(주사제에 한함.)
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 간장애 환자
2) 혈액장애 환자
3) 약물 과민반응 환자
4) 갑상선기능저하증 환자
5) 폐부전 환자
6) 서맥 환자(50 회/min 미만)
7) 저혈압 환자(수축기압 90 mmHg 미만)
8) 당뇨병 환자(인슐린 비의존성 당뇨병 환자에서 고혈당을 일으켰다는 보고가 있다)
9) 방실블록(1도) 환자
10) 심방세동, 심방조동 환자
11) 중증의 심부전 환자(심정지, 호흡정지가 일어나기 쉽다.)(주사제에 한함.)
12) 중증의 식약 환자 및 고령자(주사제에 한함.)
4. 이상반응
1) 정신신경계 : 불수의운동(이상운동증, 무도병, 고장자세불능증 등), 신경병증, 어지러움, 운동실조증, 정신착란, 구울장애, 불면, 신경과민, 주의력 · 집중력, 반사운동능력의 저하, 드물게 두통, 권태감(주사제에 한함.), 조화불능, 진전, 장기간 투여 받은 환자에서 감각말초 다발신경증 등이 나타날 수 있다. 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화를 보인다. 11종의 다른 항간질약을 사용하여 199개의 위약-대조 임상시험(단독요법과 부가요법)을 분석한 결과 항간질약 복용환자는 위약 투여환자와 비교시 약 2배의 자살충동 또는 자살행동의 위험을 보였다. 12주치의 치료가긴 동안 자살행동 또는 자살충동 발생율은 27,864명의 환간질약 치료환자에서 0.43 %였으며 16,029명의 위약 투여 환자에서는 0.24 %였다. 이는 치료받은 530명 환자 중 한명은 자살 충동 또는 자살 행동을 보인 것을 의미한다. 동 약을 치료 환자에서 4건의 자살이 있었고 위약 치료 환자에서의 자살은 없었다. 그러나 자살 예수가 너무 적어 이 약과 자살의 연관성을 결론지을 수는 없다. 항간질약 복용에 의한 자살충동 또는 자살행동의 위험 증가는 약물치료를 시작 초기 1주에 관찰되었고 치료기간 동안 지속되었다. 대부분의 임상시험은 24주 이상을 초과할 수 없었으며 24주를 초과한 자살충동 또는 자살행동의 위험은 평가할 수 없었다. 자살충동 또는 자살행동 위험은 분석된 11종의 항간질약에서 일관적이었다. 다양한 작용 기전과 사용 범위를 가진 항간질약에서의 위험성 증가는 어떤 효능으로도 사용된 모든 항간질약에 대해서도 위험성이 있음을 나타낸다. 그 위험성은 분석된 임상시험에서 연령(6~100세)에 따라 차이가 나지는 않았다.
- 2) 피부 : 드물게 간질성 패혈이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
3) 호흡 : 드물게 피부점막만증후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사증후군(리델증후군), 전신성 홍반루푸스(오티모양 증상, 드물게 두드러기 등)이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 이 약을 포함한 항간질제를 투여한 환자에게 다기관 과민반응으로 알려진 호산구증가와 전신성 증상을 동반하는 약물반응(Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS))이 보고되었다. 이러한 사례들 중에서 일부는 치명적이거나 생명을 위협하였다. DRESS는 일반적으로 비특이적인 발열, 발진, 림프절병증 및/또는 얼굴부종이 나타나며, 간염, 신염, 혈액학적 장애, 심근 염 또는 근염(때때로 급성 바이러스감염과 유사)과 같은 다른 기관계 침습과 연관되어 있다. 호산구 증가증이 흔히 나타난다. 이 질환은 증상이 다양하기 때문에 위에 설명되지 않은 다른 기관계도 침습될 수 있다. 발진이 나타나지 않더라도 발열 또는 림프절병증과 같은 과민반응의 초기 징후를 발견하는 것이 중요하다. 만약 이와 같은 증상 및 징후가 나타난다면 즉시 환자를 평가해야 한다. 만약 증상 또는 징후에 대한 다른 병인을 찾을 수 없다면, 이 약의 투여를 중지해야 한다.
- 5) 과민반응 : 때때로 성홍열모양 · 홍역모양 · 중독진도양 발진 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 6) 혈액계 : 혈소판 감소, 백혈구 감소, 골관구 감소, 무과립구증, 범혈구 감소, 적혈구 증가, 거핵아구성 빈혈, 드물게 재생불량성 빈혈, 단구성 백혈병, 용혈성 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감람하는 등 적절한 처치를 한다.

- 7) 림프계 : 드물게 림프절 종창, 림프종, 가성 림프종, 림프신병 같은 림프절 병증이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 감람하는 등 적절한 처치를 한다.
- 8) 간 : 중독성 간염, 황달 등의 간장애가 나타날 수 있다.
- 9) 신장 : 단백뇨 등이 나타날 수 있다.
- 10) 눈 · 복시, 안구진탕증, 시각장애, 드물게 백내장(주사제에 한함) 등이 나타날 수 있으므로 정기적으로 시력검사를 하는 등 적절한 처치를 한다.
- 11) 결합조직 : 치은종식, 안면가진, 다모증, 입술종창, 페로니 증후군이 나타날 수 있다.
- 12) 근골격계 : 연골에 의해 구부름, 골연화증, 치아형성부전 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상(S/P, 혈청 칼슘 저하 및 무기인 저하 등이 나타나는 경우에는 감람 또는 비타민D를 투여 하는 등 적절히 조치한다.
- 13) 기타 : 결절성 동맥주위염, 다발성 관절증, 고혈당, 때때로 구갈, 드물게 혈관통, 심혈관허탈, 심장지, 심실세동, 호흡정지, 갑작발작, 갑상샘 기능 검사(혈청 T3, T4지 등)이 나타날 수 있다(주사제에 한함).
- 14) 이 약을 장기간 투여 받은 환자들에서 골밀도 감소, 골감소증, 골다공증 및 골절이 보고되었다. 이 약 이 골 대사에 영향을 주는 기전은 밝혀지지 않았다.
5. 일반적 주의
1) 환자 및 보호자에게 항간질약이 우울증의 징후 및 증상의 발현 또는 악화, 비정상적 기분과 행동의 변화, 자살충동 및 자살행동 또는 자해충동의 위험을 증가시킬 수 있음을 알려 환자에게 이러한 증상은 행동이 발현될 경우 즉시 의료전문가에게 보고될 수 있도록 한다.
2) 갑작스레발작을 억제하는 약물은 결신발작에는 효력이 없으므로 혼합 발작형에서는 복합약물치료가 필요하다(혼합형에는 단독투여에 의한 결신발작 유발 또는 악화를 초래할 수 있다).
- 3) 연용중에 투여량의 급격한 감소나 중지예 위해 간질증진상태가 나타날 수 있으므로 투여량을 감소시키거나 중지할 때는 천천히 한다. 특히 고령자, 중환자는 독성의 징후가 일찍 나타나므로 주의한다.
- 4) 안구진탕, 구울장애, 운동실조, 안근마비 등의 증상이 과량투여로 나타나므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 최저 유효량까지 천천히 감량한다.
- 5) 치료중에 간 · 신기능검사, 혈액검사를 정기적으로 해야 한다.
- 6) 이 약의 치료로 임상시험의 결과가 바뀔 수 있다.
- 7) 이 약에 의해 졸음, 주의력 · 집중력, 반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여 중인 환자는 자동차의 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 8) 1주일 이상 근육주사를 투여 받아야 하는 환자는 위생관병 등의 다른 투여 경로를 찾아야 한다. 1주일 이하로 근육주사를 투여 받은 환자가 경구투여로 전환할 경우 근육주사 투여기간과 동일한 시간동안 본래 경구투여 용량의 50 %로 감소하여 복용한다.
- 9) 이 약의 최저범위 이상의 혈중농도는 헤파리, 정신병증, 뇌병증 드물게 비가역적으로 뇌기능이상 등의 착란상태가 나타날 수 있으므로 혈중농도를 측정하고 혈중농도가 높으면 용량을 감소한다. 용량 감소 이후에도 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 10) 비탈성 · 자발성 · 수포성 · 다형성 발진, 피부점막만증후군(스티븐스-존슨 증후군) 또는 독성표피괴사증후군(리델증후군) 등이 의심되면 이 약을 계속 사용해서는 안 되며 다른 약물로 대체해야 한다.
- 11) 포로피린증을 악화시켰다는 보고가 있으므로 주의한다.
6. 상호작용
1) 다음 약물에 의해 이 약의 작용이 증강될 수 있으므로 이러한 경우에는 감람하는 등 신중히 투여한다.
· 쿠마린계 항응고제, 디설파람, 페닐부타롤, 파라아미노살리실산, 이소니아지드, 설파일 메틸페니데이트, 에트세시미드, 테가부르, 플루코나졸, 미코나졸, 조니사마이드, 금성 알코올 섭취, 아미도론, 클로 램페니콜, 디아제팜, 디쿠마롤, 설파나미드, 할로란, 이소니아지드, 에스트로겐
2) 다음 약물에 의해 페니토인의 농도가 감소할 수 있으므로 주의한다 : 민생 알코올 함유자, 레세르핀, 클리버마제린, 수크랄페이트, 칼슘함유 제산제
3) 이세라콜리나이드와 병용하면 구부름, 골연화증이 나타나기 쉬우므로 병용하는 경우에는 신중히 투여 한다.
- 4) 페니토인에 의해 다음 약물의 작용이 감소될 수 있으므로 주의한다 : 부신피질호르몬(덱사메타손 등), 갑상선호르몬, 독사이아클린, 항응고제, 에스트로겐, 푸로세미드, 경구용 피임제, 퀴닌D, 리페미핀
5) 티오펜의 혈중농도를 저하시킨다는 보고가 있으므로 병용하는 경우에는 증람하는 등 신중히 투여한다.
- 6) 다음 약물의 병용에 의해 이 약의 혈중농도가 변화(상승 또는 저하)될 수 있으므로 병용하는 경우에는 신중히 투여한다. : 발프로산나트륨, 페도바비비들
7) 델타이펜과 병용에 의해 이 약의 혈중농도가 상승했으려 또한 펠로디핀, 베라파밀과 병용에 의해 이 약의 혈중농도가 저하되었다는 보고가 있다.
- 8) 빈카알카리이드(빈크리스틴 등)와의 병용에 의해 이 약의 혈중농도가 저하될 수 있다.
- 9) 도파민을 사용하는 환자에게 이 약을 정맥 주사하였을 경우에는 사맥 및 급격한 저혈압이 나타날 수 있다(주사제에 한함).
- 10) 리도카인 및 베타차단제와 병용하여 페니토인을 정맥주사 하였을 경우에는 심장억제 작용이 증가할 수 있다(주사제에 한함).
- 11) 페니토인은 혈당치를 증가시키므로 인슐린 또는 경구용 혈당강화제의 용량조절이 필요하다.
- 12) 페니토인과 경구용 디아족사이드를 병용하였을 경우 디아족사이드의 고혈당 작용을 감소시키므로 병용투여에 주의한다.
7. 입부에 대한 투여
1) 임신중에 이 약을 단독 또는 병용투여한 환자 중에서 기형아(구순열, 구개열, 심기형 등)를 출산한 예가 많았다는 역학조사보고가 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성모제의 간질발작 반발 예방, 태아의 자산소중예방이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 임신중에 다른 항경련제(특히 프리미돈)와 병용투여한 군에서 기형아를 출산한 예가 이 약 단독 투여 했을 때보다 많았다는 역학조사보고가 있으므로 부득이하게 이 약을 투여할 경우이라도 가능한 한 단독 투여하는 것이 바람직하다.
- 3) 임신중의 투여에 의해 태아에 중창(신경아세포종 등)이 나타났다는 보고가 있다.
- 4) 임신중의 투여에 의해 신생아에서 출혈 경향이 나타날 수 있다.
- 5) 임신중의 투여에 의해 염산 저하가 생긴다는 보고가 있다.
- 6) 임신중의 투여에 의해 태아 히단토인증후군이라 불리는 경미한 두개안면이상과 수지 비정상이 나타날 수 있다. 이 증상의 일반적 특징은 다음과 같다. 넓고 낮은 비교, 내안각 헤비, 격리증, 넓은 입, 원위 지질결, 손톱형성부전(주사제에 한함).
8. 고령자에 대한 투여
고령자는 심정지, 호흡정지 등이 일어날 수 있으므로 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여하여야 하며 투여 중지 시 천천히 하는 등 주의한다(주사제에 한함).
9. 임상검사이체의 영향
이 약은 혈청 단백결합요오드(PB)를 감소시킬 수 있다.
10. 적용상의 주의(주사제에 한함.)
1) 주사액이 갈말카리성이므로 피하주사, 혈관주위 주사는 하지 않는다.
2) 정맥내 갈말 투여에 의해 저혈압이 일어나므로 정맥주사는 50 mg/min을 넘지 않는 속도로 천천히 주사해야 한다.
- 3) 정맥용 수액에 이 약을 첨가하면 용해도가 적어서 저하된 생기로 혼합해서 사용하지 않는다.
4) 갈말카리성이므로 다른 성분과의 배합을 고려해 pH가 적어도면 페니토인의 결정이 산출될 수 있으므로 주의한다.
- 5) 이 약에 함유된 프로필렌글리콜에 의하여 알레르기를 일으킬 수 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자는 투여 전에 약사 또는 의사와 상의한다.
11. 과량투여시의 처치
1) 증상 : 주요 초기증상은 안구진탕, 구울장애, 운동실조, 안근마비 등이다. 그 외 증상으로서 진전, 고도의 긴장항진, 졸음증(ethargy), 언어장애, 구역, 구토 등이다. 중증의 경우는 혼수상태, 혈압저하, 호흡장애, 혈관계의 억제에 의해 사망하는 경우가 있다.
- 2) 처치 : 특이적 해독제는 알려져 있지 않으므로 인공호흡, 산소흡입, 혈압상승제의 투여 등으로 적절한 처치를 한다. 또 페니토인은 혈청단백과 완전하게 결합하지 않으므로 중증인 경우는 혈액투석을 고려한다.
12. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
13. 기타
1) 혈청 면역글로불린(gA, gG) 이상이 나타날 수 있다.
2) 이 약의 장기 투여로 소뇌위축이 나타났다는 보고가 있다.

■저장방법 : 밀봉용기, 차광보존

■포장단위 : 100mg(2mL)×50앰플, 250mg(5mL)×10앰플

※ 주사액이 혼탁하거나 침전물이 생긴 경우에는 사용하지 마십시오.

※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질 · 변색 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2017년 06월 08일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.



제조판매원
삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)
공 청 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단길 52
☎ : 본사(02)3140-0700, 공청(031) 353-1712/6