

수술용 화학요법제

삼진 타우로린TM 주사 2% (타우로리딘)

Taurolin[®] inj. 2% (Taurolidine)

■ 원료약품의 분량 : 100ml 중
유효성분 : 타우로리딘(별규) 2.0g
첨가제 : 포비돈PF17
용제 : 주사용증류수

■ 성상 : 무색 투명한 병에 든 무색 또는 담황색의 투명한 액제

■ 효능 · 효과

1. 화농성 · 숙변성 · 세균성 또는 기타 원인에 의한 국소적 또는 광범위 복부(복막염) 수술의 감염예방목적의 보조 치료
2. 뼈와 연조직 손상
3. 흉막강 농양

■ 용법 · 용량

1. 복막염
 - 1) 수술 중 봉합 전에 2% 타우로리딘 주사액 100~200mL를 복강내 주입한다.
 - 2) 수술 후 분비물에서 균이 검출되지 않을 때 까지 배농관을 통하여 1일 2% 타우로리딘주사액 100~200mL씩 관주하고, 1~2시간동안 막아두었다가 유출시킨다.
 2. 뼈와 연조직 손상
수술부위를 37℃로 데운 0.5% 타우로리딘 주사액으로 간헐적으로 세척한다.
 3. 흉막강 농양
수술 중 배농관을 통하여 2% 타우로리딘 주사액 100mL씩 1일 2회 관주하고, 1~2시간 동안 막아두었다가 유출시킨다.
- * 소아는 연령과 체중에 따라 적절히 감량한다.
* 반복 주입시의 통증을 감소시키기 위해 리도카인염산염수화물을 0.1% 농도로 혼합하여 사용할 수 있다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 말기 신부전 환자
 - 2) 6세 미만의 유아
2. 이상반응
국소적 복강내 투여 시 일시적인 자극, 경미한 과민반응과 작열감이 나타날 수 있다.
3. 상호작용
 - 1) 반코마이신의 전신적 투여는 이 약의 효과를 감소시킬 수 있다.
 - 2) Dakin's solution, 포비돈 요오드 또는 과산화수소와 같은 산화제와 함께 복강내 투여하지 않는다.
4. 과량투여시의 처치
현재까지 이 약의 과량투여 예는 보고된 바 없으며, 동물실험에서 이 약을 정맥투여한 경우 LD50이 마우스 4,000mg/kg 이상, 토끼 3,600mg/kg 이상으로 독성이 적다. 동물실험에서 급속 정맥투여시 일시적 미주신경자극반응(침분비증가, 눈물분비증가, 혈압 강하 등)이 나타날 수 있다.
5. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 이 약은 반드시 상온(15~25℃)에서 보관한다.
 - 2) 이 약은 저온 보관하면 백색침전이 생기는 경우가 있는데, 이런 경우에는 30도 정도로 가온 용해 한 후 사용한다.

■ 저장방법 : 밀봉용기, 상온(15~25℃)보관

■ 포장단위 : 250ml

■ 제조원

삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52(제조의뢰자)
삼성제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35(제조자)

※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2016년 06월13일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

09017
TUM-03-14-1171



판매원
삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)
공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52
☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6

기술제휴 및 원료공급원

Geistlich 
Pharma