

오스테민[®]캡슐

(결정황산글루코사민)

OSTEMIN[®] Capsule

오스테민 캡슐은 관절연골의 대사과정 중에 기질로써 직접 작용하는 활성물질인 결정 황산 글루코사민을 주성분으로 함유하는 제제로서, 관절의 연골세포를 구성하는 물질인 Proteoglycan의 생성을 정성, 정량적으로 자극하여 정상화시켜주고, 관절의 활액생성을 증가시키고 점도를 개선하여 윤활작용을 함으로서 관절 기능을 원활하게 해주므로 골관절의 변성과정을 억제하고 회복시켜주는 골관절염 치료제입니다.

- **원료약품의 분량** : 1캡슐 중
결정글루코사민황산염(EP)..... 312.5mg
(글루코사민황산염으로서 250mg)
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호, 황색203호

- **성상**
백색내지 담황갈색의 가루 또는 과립상이 든 상부 적색, 하부 미황색의 캡슐

- **효능 · 효과**
경증(가벼운 증상)에서 중등도의 골(뼈) 관절염(퇴행성관절염)

- **용법 · 용량**
성인 : 글루코사민황산염으로서 1회 500mg(2캡슐)을 1일 3회 6주간 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약 을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응(갑각류 알레르기 포함) 및 그 병력이 있는 사람
 - 급성 관절통 환자
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactasedeficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 다음의 약물을 투여받고 있는사람
 - 와파린 : 국제정상화비율(INR)이 높아진다. 와파린치료 환자에 있어 글루코사민 치료 시작 시 또는 치료종료시에 국제정상화비율(INR)을 모니터한다.
 - 테트라사이클린 : 병용(함께 복용)투여 시 테트라사이클린의 소화관 흡수가 증가될 수 있다.
 - 페니실린, 클로람페니콜 : 병용(함께 복용)투여 시 페니실린, 클로람페니콜의 소화관 흡수가 감소될 수 있다.
 - 천식 환자 : 천식이 악화될 수 있다.
 - 18세 미만 : 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용 발현(드러냄)에 특히 유의한다.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부(임부투여에 대한 충분한 사용 경험이 없다)
 - 간장애환자, 신장애(신장장애) 환자(이 환자들의 투여 용량에 대한자료가 없다)
- 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF) 를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 중추신경계 : 두통, 피곤함, 졸림.
 - 소화기계 : 구역 · 구토, 복통(배아픔), 소화불량, 변비, 설사
 - 피부 : 습진, 가려움, 발진
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 증상개선은 복용 수주 후부터 나타날 수 있다.
 - 복용 시작 6주 후에도 증상이 좋아지지 않으면, 복용 지속여부에 대해 의사, 약사와 상담해야 한다.
 - 당뇨병환자 : 이 약은 골격근의 인슐린 저항성을높일 수 있기 때문에 복용 하는 동안 혈당 체크를 자주 해야 한다.(동물 실험에서 혈당을 높인다는보고가 있다.)
 - 심혈관 질환 위험 환자 : 고콜레스테롤 혈증이 관찰될 수도 있으므로 혈중 지질 농도를 체크한다.
 - 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량(줄임), 휴약(복용 중지) 등의 적절한 조치를 한다.
 - 약물요법이외의 치료법도 고려한다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **포장단위** : 90, 180캡슐

※ 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 · 오염 되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자(2013년 4월) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.



제조판매원

삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)

공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6



원료공급원

RottaPharm S. p. A, Italy