

시프로겔 3% (케토프로펜)

Cyprogel 3% (Ketoprofen)

일반의약품
분류번호 264

KGMP
적격업체제품

■ 원료약품의 분량 : 1g중

유효성분 : 케토프로펜(KP)..... 30mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1.5mg,
파라옥시벤조산프로필 0.5mg
기타첨가제 : 디에탄올아민, 라벤더오일, 에탄올,
오렌지유, 정제수, 카보머940, L-멘톨

■ 성상 : 방향성을 갖는 거의 무색투명한 점액성의 겔제

■ 효능 · 효과 : 다음 질환 및 증상의 진통 · 소염(항염) : 퇴행성관절염(골(뼈)관절염), 어깨관절주위염, 건염(힘줄염) · 건초염 (힘줄윤활막염), 건주위염, 상완골(위팔뼈) 상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상 (상처)후의 종창(부기) · 동통(통증)

■ 용법 · 용량 : 증상에 따라 적당량을 1일 수회(여러차례) 환부(질환 부위)에 바르고 잘 스며들도록 가볍게 문지른다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 및 광과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식 발작을 일으킬 수 있다)
 - 3) 다음의 약물에 과민증의 병력이 있는 환자 : 티아프로펜산, 페노피브레이트, 베자피브레이트, 시프로피브레이트, 옥시벤존(케토프로펜과 교차과민반응

나타날 수 있으며 피부발진이 전신으로 확대될 수 있다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지한다.

- 4) 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 1) 이 약을 사용 중이거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이, 옥외활동을 피하고, 일상 외출할 때에는 이 약의 도포(바른)부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선 차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 한다. 흰색이나 얇은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 유색 옷을 입는다.(자외선에 의해, 사용 중 또는 사용 후 광과민증이 나타났다는 보고가 있다.)
 - 2) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)이다.
 - 3) 피부감염증을 드러나지 않게 할 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용하고 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄)에 유의한다.
 - 4) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다. 또한 상태를 충분히 관찰하여 이상반응에 유의한다.
 - 5) 눈 및 점막에는 사용하지 않는다.
 - 6) 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운 통증을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다
 - 7) 무좀, 백선 등에는 사용하지 않는다.
 - 8) 밀봉봉대법을 사용하지 않는다.

을 유발할 수 있다)

- 4) 임신기간 6개월 이상인 임부 : 임신 말기의 랫트에 이 약을 경구투여한 실험에서 태자의 동맥혈관수축이 보고되었다. 임신후기에 투여(경구, 주사, 직장주입)시 지속성 태아순환, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있다.
- 5) 15세 미만의 소아
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있다)
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부 또는 수유부 (안전성이 확립되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용은 피한다.)
3. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 드물게 속, 아나필락시양 증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성유사 증상)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
 - 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성 수포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거름), 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타난다.
 - 3) 피부 : 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 수포, 짓무름, 자극감 및 종창(부기) 등의 접촉피부염, 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있다. 또한 직사일광(자외선)에 의해 광과민증이

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

■ 포장단위 : 20, 50, 100g

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 주의

1. 의약품용 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

2. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.

3. 사용중 중간에 공기가 찬 부분이 나올 수 있으나 중량에는 문제가 없습니다.

※ 만약 구입시 유통기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2017년 09월 13일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

09017

CGO-13-22-1171

제조판매원

SAMJIN

삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)

공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1172/6