

간장질환용제

KGMP 전문의약품
적격업체제품 분류번호 391

피스리바® 정 (비페닐디메틸디카복실레이트)

Peaceliva Tab. (Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate)

피스리바®정은 한방약제로 널리 사용되어온 오미자열매로부터 분리된 유효성분 Schizandrin C의 합성동족체인 Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate(BDD)를 주성분으로 하는 제제입니다.

피스리바®정은 만성 간염 및 약물로 인한 간염시 지속적으로 상승되는 ALT를 정상화하는 등 간기능 개선효과를 나타내고, 간의 해독 효소를 증가시킴으로써 약물 및 독성물질의 무독화를 촉진하며, 유해인자로 인한 간세포파괴를 억제하는 효과를 나타내므로 바이러스나 약물로 인한 만성간염치료에 효율적으로 사용할 수 있는 제제입니다.

■원료약품의 분량 : 1정 중

비페닐디메틸디카복실레이트(별규)..... 25.0mg

■성상 : 백색의 장방형 정제

■효능 · 효과

지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성 간염 및 약물로 인해 트랜스아미나제(Transaminase)가 상승된 간염

■용법 · 용량

성인 : 비페닐디메틸디카복실레이트로서 1회 25~50mg,
1일 3회 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음환자에게는 신중히 투여 할 것
 - 만성 활동성 간염환자
 - 간경변 환자
- 이상반응
 - 입안마름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 항과민약을 병용투여하면 소실된다.
 - 일과성 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실된다.
 - 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실된다.

4. 상호작용

이노신(inosine)과 함께 투여시에, 재발한 ALT의 상승이 개선될 수 있다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 및 수유부에는 투여하지 않는다.

6. 소아에 대한 투여

소아에는 용량을 감소시켜 투여한다.

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.

8. 임상검사치에의 영향

치료 중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없다. 투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이 약의 재투여로 개선된다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는것은 의약품오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

■저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■포장단위 : 90, 1000정

※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2010년 3월 23일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실/수신자 부담 전화 080-082-1234에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

06016
PRT-03-12-1171



제조판매원

삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 외우산로 121 (서교동)
공 정 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52
☎ : 본사(02)3140-0700, 공청(031)353-1712/6