

근긴장상태의 개선 및 경성마비에...

# 세카론® 정

(아플로쿠알론)

KGMP  
적격업체제품

전문약품  
분류번호 119

## Sekaron Tab. (Afloqualone)

세카론®정은 중추성 근이완제로서 뇌·척수혈관장애, 뇌·척수마비, 뇌·척수의 손상 및 병성질환 등 여러 원인에 인한 뇌 및 척수장애시 주요증상으로 나타나는 경성마비 치료 및 이들 환자군의 재활요법에 효과를 나타내며, 어깨결림, 목의 빠근함, 두중감 등의 경견완중후군 및 요통증 등의 일상적인 근긴장상태를 개선하여 주는 제제입니다.

### ■ 원료약품의 분량 : 1정 중

아플로쿠알론(JP) ..... 20mg

### ■ 성 상

백색의 원형 당의정

### ■ 효능·효과

1. 다음 질환으로 인한 근긴장상태의 개선 : 경견완중후군, 요통증
2. 다음 질환으로 인한 경성(痙性)마비 : 뇌혈관장애, 뇌성마비, 경성척수마비, 척수혈관장애, 경부척추증, 후종인대(後發韌帶)골화증, 다발성 경화증, 근위축성 축색경화증, 척수소뇌변성증, 외상후유증(척수손상, 두부외상), 수술후 후유증(뇌·척수장애를 포함), 기타 뇌척수질환

### ■ 용법·용량

성인 : 아플로쿠알론으로서 1회 20mg 1일 3회 경구 투여합니다.  
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

### ■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.  
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
  - 1) 정신신경계 : 때때로 비틀거림, 어지러움, 졸음, 드물게 두통, 두중 등이 나타날 수 있습니다.
  - 2) 소화기계 : 때때로 구역, 식욕부진, 복통, 위부불쾌감, 드물게 구토, 설사, 구갈, 변비, 복부팽만감, 위염 등이 나타날 수 있습니다.
  - 3) 피부 : 드물게 광선 과민증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
  - 4) 과민증 : 때때로 발진, 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
  - 5) 기타 : 때때로 무력감, 권태감, 드물게 부종, 이명, 빈뇨, 구내염이 나타날 수 있습니다.
3. 일반적 주의  
졸음, 반사운동능력의 저하 등이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인

환자는 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.

### 4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
  - 2) 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이 한 경우에는 수유를 중단합니다.
5. 소아에 대한 투여  
소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적다.).
6. 고령자에 대한 투여  
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

### ■ 저장방법 : 차광 기밀용기

### ■ 포장단위 : 100정(PTP), 100정(병), 500정(병)

※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2016년 5월 26일) 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.samjinpharm.co.kr](http://www.samjinpharm.co.kr))나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

05016

SCT-03-14-1171

제 조 판 매 원

SAMJIN

삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 외우신로 121 (서교동)

공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6