

위드TM

캡슐 (테프레논)

WITHTM Cap. (Teprenone)
■ 원료약품의 분량 : 1캡슐 중

유효성분: 테프레논(별규) 50mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색5호, 황색203호

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

기타첨가제: 상부 회청록색, 하부 담두색의 경질캡슐제, 실리콘디옥시드, 옥수수전분, 툴크, 토코페올, 폴리비닐피롤리돈6000

■ 성 상

백색-미황백색의 과립 및 분말이 든 상단은 회청록색 하단은 담두색의 경질캡슐제

■ 효능 · 효과

주효능 · 효과

• 위궤양

• 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

■ 용법 · 용량

성인 : 테프레논으로서 1일 150mg를 3회 분할 식후에 경구 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF) 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 (이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있다.)

3. 부작용

1) 소화기계 : 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구갈, 구역, 복통 등의 증상이 나타날 수 있다.

2) 간장 : 때때로 GOT, GPT치의 가벼운 상승이 일어날 수 있다.

3) 정신신경계 : 드물게 두통 등의 증상이 나타날 수 있다.

4) 피부 : 드물게 발진, 전신가려움증 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나면 투여를 중지한다.

5) 기타 : 드물게 총 콜레스테롤치의 상승, 안검의 발적,

열감이 나타날 수 있다.

4. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

5. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.(사용경험이 없음.)

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 90, 500 캡슐

※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변태 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

 ※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2017년 09월 18일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)또는 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

 09017
 WDC-03-19-1171

제조판매원
SAMJIN **삼진제약주식회사**

본 사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)

공 정 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공점(031) 353-1712/6