

뇌 및 말초혈액순환 개선

파누스TM 정(은행엽엑스)



일반의약품
분류번호 219
KGMP
적격업체제품

Parnus[®] Tablet 40mg

혈액은 온몸을 순환하며 각 세포에 필요한 산소·영양소·호르몬 등을 신체 각 부위로 운반하고, 각 세포에서 생성된 노폐물을 운반 제거합니다. 그러므로 혈액순환이 잘되지 않으면, 신체 각 부위는 제기능을 발휘하지 못할 뿐만 아니라 각종 장애와 질환이 발생합니다. 중년 이후에 나타나는 두통, 현훈, 손발저림, 기억력 감퇴, 이명, 피로감 등 성인병의 제증상은 혈액순환을 원활히 함으로써 예방 치료할 수 있습니다.

파누스TM 정은 혈관의 손상방지 및 탄력유지, 혈액의 점도저하, 말초혈관확장, 뇌순환 개선·작용으로 혈액순환을 원활하게 하여줍니다.

■원료약품의 분량 : 1정 중

은행엽엑스(생규) 40.0mg
첨가제(타르색소) – 황색203호 알루미늄레이크, 청색호 알루미늄레이크

■성상 : 연녹색의 원형필름 제피정

■작용

1. 혈관의 손상방지 및 탄력유지
파누스TM 정은 혈관세포를 파괴하여 혈관벽을 손상시키는 유리기(free radical)를 제거하거나 생성을 억제하여 혈관을 보호하고 탄력성을 유지합니다.
2. 혈액의 점도저하
파누스TM 정은 적혈구막을 안정화하여 적혈구의 파괴를 막고, 혈소판 및 적혈구 응집을 억제하여 혈전생성을 방지함으로써 혈액점도를 저하시켜 혈액순환이 원활하도록 합니다.
3. 말초혈관 확장작용
파누스TM 정은 혈관확장인자(EDRF)를 유리시켜 말초혈관을 확장시킴으로써 혈액순환을 원활하게 합니다.
4. 뇌혈액 순환개선
파누스TM 정은 뇌혈액 순환을 개선하여 뇌에 충분한 혈액을 공급함으로써 두통, 어지러움, 기억력 감퇴, 이명 등 뇌순환 장애로 인한 여러 증상을 예방·치료합니다.

■효능·효과

1. 주효능·효과
 - 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
 - 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
 - 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

■용법·용량

- (성인)
1. 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여한다. (복용한다.)
 2. 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다.(복용한다.) 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
 - 1) 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
3. 일반적 주의
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
4. 임부에 대한 투여
동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
5. 소아에 대한 투여
소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

■저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■포장단위 : 100, 500정

※ 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 5월 6일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.saminpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.

05015
PN-03-10-1171



제조판매원

삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 서교동 338-8
공 장 : 경기도 화성시 향남읍 상신리 904-2
☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031)353-1712/6