

콘로인TM캡슐 (콘드로이틴설페이트나트륨)

ChonroinTM Cap.(Sodium Chondroitin Sulfate)

콘로인TM캡슐에 함유된 콘드로이틴설페이트나트륨은 신체의 결합조직 특히 관절부위 연골 (물렁뼈)의 주성분으로서 연골외에도 인대, 건, 점액, 섬유, 혈관 등에 분포되어 있으며, 관절 연골의 재생을 촉진하고 관절세포를 보호·활성화하는 역할을 하는 생체활성물질입니다. 콘로인TM캡슐은 콘드로이틴설페이트나트륨이 고단위로 함유된 관절질환 치료제로서, 손상된 관절연골의 재생을 촉진하여 관절의 회복을 돕고 관절에 영양을 공급하여 결합조직을 활성화 시키므로 퇴행성관절염, 관절통, 신경통, 건관절주위염 등의 만성적 관절질환등을 효과적으로 개선시켜 줍니다. 또한 콘로인TM캡슐에 함유된 콘드로이틴설페이트나트륨은 인체내 관절부위의 주성분이므로 부작용이나 독성 및 습관성이 적어 장기간 치료를 요하는 관절질환의 치료에 사용할 수 있는 제제입니다.

■ 원료약품의 분량

1캡슐 중
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)..... 400mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 황색5호

■ 성상

흰색·유백색의 분말이 충전된 상부 주황색, 하부 담황색의 캡슐제

■ 효능·효과

경증(가벼운 증상)에서 중등도의 골관절염(퇴행성관절염)

■ 용법·용량

성인 : 콘드로이틴설페이트나트륨으로서 1회 400~800mg을 1일 2회 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 급성 관절통 환자
 - 16세 미만
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부(이 약은 임부나 수유부에게 권장되지 않는다)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 소화기계 : 구역·구토, 변비, 설사, 식욕부진
 - 피부 : 홍반(붉은 반점), 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종(부기)
 - 기타 : 부종(부기)·수분저류(수분 쌓임)(신부전 또는 심부전 환자)
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상 이 있을 경우 감량(줄임), 휴약(복용 중지) 등의 적절한 조치를 한다.
 - 악물요법 이외의 치료법도 고려한다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용(잘못사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 : 차광한 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 100, 300캡슐

※ 주의

- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.
- PTP포장의 경우, PTP 포장을 개봉하여 복용 시 가품 캡슐제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 캡슐제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.

※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 문안개정일자(2016년 01월 21일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.