

한국유나이티드

산화마그네슘 정 250mg

KU. MAGNESIUM OXIDE Tabs.
(Magnesium Oxide)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

산화마그네슘(KP) ······ 250mg

동물유래성분 : 젤라틴(KP) / 기원동물 : 소 / 사용부위 : 가축

[성 상] 흰색의 원형정제

[효능·효과]

1. 주효능 효과

- 1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다
- 2) 변비증

[용법·용량]

1. 성인

- 1) 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 산화마그네슘으로서 1일 0.5~1g을 수회(여러차례) 분할 경구 투여한다.
- 2) 변비증 : 1일 2g을 1~2회 분할 경구 투여한다.(먹는다)
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 않것.

- 1) 신장에 환자(심한 신기능장애 환자에서 고마그네슘혈증이 나타날 수 있다.)
- 2) 설사 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 심기능 장애 환자
- 2) 고마그네슘혈증 환자

3. 부작용

1) 소화기계 : 때때로 설사 등이 나타날 수 있다.

2) 대사이상 : 장기 대량투여에 의하여 고마그네슘 혈증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량(줄임) 또는 휴약(복용(사용)중지) 등 적절한 처치를 한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

- 복용 후 다음 증상이 나타난 경우

- 1) 순환기 : 일어섰을때 느끼는 현기증(어지러움), 맥(맥박)이 느려짐
- 2) 정신신경계 : 강한 졸음, 의식이 희미해짐
- 3) 기타 : 숨막힘, 근력저하, 구강(입안)건조

5. 일반적 주의

마그네슘 중독증상이 나타나면 칼륨염을 주사한다.

6. 상호작용

1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용(함께 복용(사용))투여하지 않는다.

2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 병용(함께 복용(사용)) 약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.

3) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용(함께 복용(사용))시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위

※ 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항과 이후 변경된 내용은 본사 의약품정보부(02-516-6103)로 문의하시기 바랍니다.

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

TS621-50602

최종개정일자 : 2015년 6월 2일

제조의회사/판매원:



한국유나이티드제약 (주)

세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23

제조사:



삼남제약(주)

충청남도 금산군 금산읍 인심로 77