

헥사메딘 맥 250mL

(클로르헥시딘글루콘산염)

약효분류 : 231치과구강용약 일반의약품 ※ 삼키지마세요.

【원료약품 및 그 분량】 100g 중
클로르헥시딘글루콘산염액(KP) 0.5mL
(클로르헥시딘글루콘산염으로서 0.1g)

【성상】 무색 투명한 액제로서 방향성을 지니고 있다.

【효능·효과】 1. 주효능 효과 / 다음 질환에 의한 염증의 완화 : 보철(의치)에 의한 염증, 이구창 등의 구강(입안)내 칸디다감염증, 치은염(잇몸염), 인두염, 아프타성구내염(입안염)

2. 다음 질환에도 사용할 수 있다. / 치근(치아뿌리)막 수술 후 살균소독
【용법·용량】 1회 15mL 1일 2회 약 1분동안 양치질하며, 의치로 인한 구내염(입안염)의 경우에는 의치를 1일 2회 15분간 담가 세척한다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고 / 구강(입안)내 정상 세균총(세균집단)의 불균형을 유발할 수 있으므로 장기간 투여하지 않는다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것. / 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. / 천식 등 알레르기 질환이 있거나, 이러한 병력 또는 가족력이 있는 환자
4. 부작용 / 1) 구강(입안) : 치아나 구강(입안)표면에 착색 증가, 치은연

상치석 형성 증가, 미각각의 변화등이 나타났다. 특히 소아에서 구강(입안)점막의 표피탈락, 경미한(가벼운) 자극이 보고된바 있다. 2) 속 : 드물게 속증상이 일어날 수 있으므로 충분히 관찰하고 구역, 불쾌감, 식은땀, 어지러움, 답답함, 호흡곤란, 발작 등이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 3) 과민증 : 때때로 발진, 두드러기 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다. 4) 기타 : 클로르헥시딘 함유 구강(입안)세척제제에서 일시적인 이하선염(귀밑샘염)이 보고된바 있다.

5. 일반적 주의 / 1) 일반적인 세균감염시에는 항생물질을 투여하여야 한다. 2) 치료는 보통 10일을 넘지 않는다. 3) 치은염(잇몸염)과 치주막염(치아주위 조직막염)이 합병된 환자를 이 약으로 치료한 후, 치은염(잇몸염)의 유무는 치주막염(치아주위조직막염) 치료의 중요한 판정 기준으로 이용해서는 안된다. 4) 치아표면, 보철물, 혀의 뒷면과 같은 구강(입안)표면에 착색을 일으킬 수 있다. 5) 거친 표면이나 틈이 있는 안면(얼굴)정방의 보철물을 착용한 환자에는 신중하게 투여해야 한다. 치과적인 예방에 의해 착색이 제거되기 어렵고, 드물게 보철물을 바꿔야 할 경우가 있으므로 착색되는 것을 원하지 않는 환자에는 투여하지 말아야 한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여 / 1) 임부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회하는(웃도는) 경우에만 투여한다. 2) 모유로 이 약물이 이행되는지는 알려지지 않았으나, 많은 약물이 모유로 분비 되므로 수유부에는 신중히 투여한다.

7. 소아에 대한 투여 / 18세 미만의 소아에 대한 유효성 및 안전성은 확립되어 있지 않다.

8. 적용상의 주의 / 함수용으로만 사용하고, 내복용으로 사용하지 않는다.
9. 저장상의 주의사항 / 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사 일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다. 3) 화기에 가까이 두지 않는다.

【저장방법】 차광 기밀용기, 상온보관

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조
※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 ♣ <http://www.bukwang.co.kr>

색상이 무색으로 변경되었습니다.

제조번호 :

사용기한 :

부광약품주식회사

제조의회사:부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47
제조자:성광제약(주) 충남 천안시 서북구 백석공단 1로 47

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 03월 04일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.



030415