

070617

변비치료의 1차 선택제

아기오[®]

과립

현대인의 식생활습관이 점차 서구화, 인스턴트화 되어감에 따라 식이성섬유(Dietary fiber)의 섭취부족으로 인한 여러가지 질환이나 증상을 겪고있는 사람들이 많아지고 있습니다. 고단백, 고지방, 저섬유, 인스턴트식품으로 대표되는 서구식 식생활습관이 계속되면 장의 정상적인 배설기능의 이상으로 인해 변비는 물론이고, 숙변, 설사, 이금후증, 과민성대장증상, 게실(결주머니)질환등과 같은 장질환이 발생할 수 있고 장내대사기능의 이상으로 인해 각종 성인병의 원인이 될 수도 있습니다. 따라서 전류섬유소의 부족으로 인한 각종 장질환 및 성인병을 예방하기 위해 추천될 수 있는 방법으로는 식이성섬유(Dietary fiber)의 섭취량을 증가시키는 것이라고 할 수 있습니다.

아기오과립은 생약전문회사인 독일의 Madaus사에서 개발한 천연의 식이성섬유(Dietary fiber)제제이며, 장의 운동을 조절해주는 녹차 잎의 섬유질(Insoluble fiber)과 글라스테를, 당, 담즙산 등의 체내대사를 조절하는 가용성섬유질(Soluble fiber)이 적절한 비율로 배합된 과립형 제제로서 서구화되어가는 식생활패턴으로 인해 부족하기 쉬운 Dietary fiber를 매일 간편하게 보급해줌으로써 장기능을 정상화시켜 드립니다.

【원료약품 및 그 분량】 1회량(6g) 중,

유효성분 : 아기오올원료과립(법규) 4.08g

[차전자(USP) 3.9g, 차전자파(BP) 0.13g]

첨가제 : 경질성도파라핀, 박하유, 백당, 산화티탄, 세이지유, 아라비아고무, 적색산화철, 캐러웨이유, 달크, 파라핀, 황색산화철

【성상】 방향성 냄새가 나는 황갈색의 미세과립으로 직경은 1-3mm이다

【효능·효과】 1. 변비 2. 변비로 인한 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】 성인 및 15세 이상의 소아 : 1회 1~2 포를 1일 1회 저녁 식후에 복용한다. 이 약은 씹지 말고 물 1~2컵과 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 장폐색(창자막힘), 장결석 환자
- 2) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- 3) 진단되지 않은 복통, 구역, 구토 환자
- 4) 위장관내(특히 기도부근)의 협착증 및 연하곤란 환자
- 5) 거대결장증후군 환자

6) 심한 당뇨병 환자

7) 15세 미만의 소아

8) 이 약에 과민반응 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 팽창제와 장관 운동을 억제시키는 지사제(디펜옥실레이트, 디펜옥신, 로페라미드염산염, 아편 등)와 병용투여하지 않는다(장관 폐쇄가 일어날 수 있다).

2) 다른 하제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 의사의 치료를 받고 있거나 다른 약물을 복용하고 있는 환자
- 4) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 환자
- 5) 인슐린을 투여하여야 하는 당뇨병 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진· 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
- 2) 1주 정도 복용하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 복부팽만감 등의 증상이 이미 있었던 환자는 치료 초기에도 증상이 지속될 수 있으나 치료를 계속하면 소실된다.
- 3) 약사 또는 의사와 상의 없이 장기간 복용하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【포장단위】 6그램/포x100포 【저장방법】 기밀용기, 습기를 피하여 실온보관

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) → 의약품유해사례보고에 알려도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매 업자에 대하여 교환해 드립니다.

제조: 판매
부광약품주식회사
경기도 안산시 단원구 능안로 47

기술제휴
MADAUS GmbH
Federal Republic of Germany

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통하료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

☎ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2017년 07월 06일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.