

082517

경련완화제

펙사딘[®] 캡슐

Fexadin[®]capsule
(페노베린)

펙사딘[®]캡슐은 프랑스 Vaillant Defresne Laboratory에서 개발한 페노베린을 주성분으로 하는 장기능 정상화제로서 기존의 4급 암모늄 제제와는 달리 위장관 평활근 세포내로의 Ca⁺⁺ 유입을 선택적으로 조절하여 이상화(異常化)된 장관 기능을 자연스럽게 회복시킵니다.


【원료약품 및 그 분량】1캡슐 중

유효성분 : 페노베린(별규) 100mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 젖)

첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호

기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, (상) 밝은 청색 캡슐, (하) 하늘색 캡슐, 스테아르산마그네슘, 폴리에틸렌글리콜6000



화학명[(piperonyl - 4 - piperazinyl - 1) - 2 - acetyl] - 10 - phenothiazine

【성상】

상단 밝은 청색, 하단 하늘색의 캡슐 내 흰색 분말

【임상적 특징】

1. 정상적인 장관 평활근의 운동은 저해하지 않습니다.
2. 경구투여로 장관흡수가 신속합니다.
3. 안전역이 넓고 내용성이 우수하며 항콜린성 부작용이 없습니다.

【효능·효과】

과민성대장염, 월경통

【용법·용량】

성인 : 페노베린으로서 1회 100mg을 1일 3회 식간에 경구투여한다. 환자의 상태에 따라 1회 200mg까지 증량할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
신부전 또는 간부전 환자에는 투여하지 않는다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약에 과민반응 환자
 - 2) 마취중, 마취후 또는 운동후 고열, 악성 고열 환자
 - 3) 미토콘드리아성 근장애 환자
 - 4) 만성 간질환 또는 그 병력이 있는 환자(간경변, 급성 간염, 알코올성 간염, 만성 알코올 남용자, 간암)
 - 5) 12세 미만의 소아
 - 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 60세 이상의 고령자
 - 2) 여러 약물을 투여 받고 있는 환자
4. 이상반응
 - 1) 소수의 환자에서 구갈, 변비, 위장장애가 나타날 수 있으나 용량조절로 소실된다.
 - 2) 근육통, 탈력감, 크레아틴키나아제(CK) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 급격한 신기능악화를 수반한 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 주의한다.
5. 일반적 주의
 - 1) 설명할 수 없는 근육통이 발생하거나 근병증으로 진단된 경우에는 치료를 중단하고 의사와 상의한다. 신부전을 초래할 수 있는 횡문근융해증의 발생 여부를 확인하기 위하여 크레아틴키나아제 수치를 확인하여야 한다. 이러한 근육증상의 발현으로 근육내 산화기전의 유전적 질환을 발견할 수 있다. 악성이상고열증에 대한 가족력을 확인할 수 있다.
- 2) 이 약이 운전 또는 기계조작에 영향을 미치는 영향에 대해 알려진바는 없으나, 구역, 어지럼(dizziness) 또는 운전이나 기계조작에 장애를 일으킬 수 있는 기타 이상반응이 나타날 경우 즉시 행동을 멈추고 의사와 상의하도록 한다.
6. 상호작용
다른 약물과의 상호작용은 보고되어 있지 않으나 주의깊게 임상증상을 관찰하면서 다른 약물과 병용투여한다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는다.
 - 2) 모유중으로의 이행에 대하여 연구되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
8. 저장상의 주의사항
소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【포장단위】 30, 500캡슐/병

【저장방법】 기밀용기

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매
부광약품주식회사
경기도 안산시 단원구 능안로 47

기술제휴
eurodrug laboratories
Netherlands

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

☎ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일(2017년 08월 25일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.