

일반의약품

분류번호 : 235 최토제, 진토제

멀미엔 간편하게

벵드롱[®]액

Bengdelong[®] solution

30ml

【원료약품 및 그 분량】(1병(30ml) 중,
 유효성분 : 메클로진염산염수화물(KP) ... 25mg,
 클로르페니라민말레산염(KP) ... 2mg, 파라독신
 염산염(KP) ... 10mg, 카페인무수물(KP) ... 25mg
 첨가제(보존제) : 파라옥사벤조산메틸 21mg, 파라옥사벤
 조산프로필 0.9mg, 기타 첨가제 : 백당, 베타딘스, 시트르
 스향0.05%, 시트르산수화물, 에탄올, 정제수, 폴리에틸렌스
 유배

【성상】콜리항이 있는 무색 또는 미색의 투명한 액

【효능·효과】멀미에 의한 어지러움·구토·두통의 예방 및 완화

【용법·용량】성인: 멀미의 예방에는 승차 또는 승선 30분 전에 성인 1회 1병을 복용한다. 또 필요시 추가 복용할 경

우에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용한다. 1일 복용 횟수는 1일 3회를 한도로 한다.

【사용상의 주의사항】1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 / 1) 약으로 일례로 증상 발진, 발적충혈되어 붉어짐, 가려움 등을 일으킨 알이 있는 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 3) 뇌신경의 통증, 눈의 침침함 등, 배뇨(소변을 남) 장애 환자 4) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자 2. 부작용 / 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적충혈되어 붉어짐, 가려움 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다. 2) 이 약을 투여함으로써 배뇨(소변을 남) 장애 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다. 3) 이 약을 투여함으로써 구갈(구미름)이 나타날 수 있다. 4) 일반적인 주의 / 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 소이에게 투여하지 않는다. 3) 이 약이 약해 줄음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다. 4) 상호작용 / 다음 약물과 병용할 때 투여하지 않는다. : 다른 진토제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제, 진해제, 항콜린제, 항지혈제 5. 저장상의 주의사항 / 1) 소이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2. 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 뚜껑을 꼭 닫아 보관한다. 3. 오용·잘못된 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】30ml 바이알/병

【저장방법】차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관



※ 소비자상담실 : TEL 080-933-2233

※ 온라인의약품도서관(<http://drugmids.go.kr>)

의약품 정보 참조

제조번호 : 17005

사용기한 : 2020.11.01

부광약품주식회사

제조의뢰자 : 부광약품(주)

경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조자 : 삼성제약(주)

경기도 화성시 함남읍 제약공단 2길 35

(01) 08806422005522

102517