



일반의약품

약효분류 : 391 간장질환용제

102418

레가론[®] 캡슐 140

Legalon[®] Cap.140
(밀크시슬건조엑스산)

독일 MADAUS사에서 개발된 레가론[®] 캡슐140은 고단위의 간장질환 치료제로서 생물학적 이용률이 높아 1일 2회 복용이 가능한 제품입니다. 이미 수십년 동안 아시아 및 서구 각국의 임상 의사들에 의해 우수한 효과가 입증된 주성분 실리마린과 실리빈은 약용식물 *Cardus marianus* L.의 종자에서 분리한 활성성분으로, 현대인의 생활에서 비롯되는 간독성 물질(흡연, 음주, 파로, 환경오염, 스트레스 및 파로, 간독성 약물)로부터 간세포를 보호하며 간조직을 재생시키는 역할을 합니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

유효성분 : 밀크시슬건조엑스산(별규) 339.4mg

(실리마린으로서 140mg, 실리빈으로서 60mg)

첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호, 황색 203호

기타 첨가제 : 경질캡슐, 만니톨, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 포비돈K25, 폴리소르베이트80

【성상】

황색 분말이 든 적갈색 경질캡슐

【효능·효과】

다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

【용법·용량】

성인 : 실리마린으로서 초기용량 1회 140mg(또는 실리빈으로서 1회 60mg), 1일 3회, 유지용량 1회 70mg(또는 실리빈으로서 1회 30mg), 1일 3회(또는 1회 140mg(또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 심한 담도(담관) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

임부, 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 드물게 위통 또는 설사
 - 2) 알레르기 반응
4. 이 약의 복용시 주의할 사항
- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 30캡슐/병, 100캡슐/병, 500캡슐/병

【저장방법】 기밀용기, 실온보관

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례 보고)에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 민원, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매
 **부광약품주식회사**
경기도 안산시 단원구 능안로 47

기술제휴
 **MADAUS GmbH**
Federal Republic of Germany

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편익을 위해 부광약품이 통하료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 10월 24일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.