

071718

레가론[®] 캡슐 70

(밀크시슬간조엑스산)

레가론[®]캡슐 70은 원개발사인 독일 MADAUS사의 원료만을 사용하여 만든 제품입니다.

이미 수십년 동안 아시아 및 서구 각국의 임상 의사들에 의해 우수한 효과가 입증된 주성분 실리마린과 실리빈은 약용식물 Carduus marianus L.의 종자에서 분리한 활성성분으로, 현대인의 생활에서 비롯되는 간독성 물질(흡연, 음주, 과로, 환경오염, 스트레스 및 피로, 간독성 약물)로부터 간세포를 보호하여 간조직을 재생시키는 역할을 합니다.

【원료약품 및 그 분량】1캡슐 중

유호성분 : 밀크시슬간조엑스산(법규) 169.7mg

(실리마린으로서 70mg, 실리빈으로서 30mg)

첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호, 황색 203호

기타 첨가제 : 만니톨, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 포비돈K25, 폴리소르베이트80, (상, 하)적갈색 경질캡슐

【성상】

황색 분말이 든 적갈색 경질캡슐

【효능·효과】

다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

【용법·용량】

성인 : 실리마린으로서 초기용량 1회 140mg(또는 실리빈으로서 1회 60mg), 1일 3회, 유지용량 1회 70mg(또는 실리빈으로서 1회 30mg), 1일 3회(또는 1회 140mg(또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회)복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 심한 금도담과 폐쇄 환자

2) 이 약의 과민증 환자

3) 12세 이하의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

임부, 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 드물게 위통 또는 설사

2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.

2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.

3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오염(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관

【포장단위】 30캡슐/병, 500캡슐/병

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타나면 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) → 의약품유해사례보고에 알리도록 하십시오.※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 민원, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 하여 교환해 드립니다.

제조·판매
부광약품주식회사
경기도 안산시 단원구 능안로 47

기술제휴
MADAUS GmbH
Federal Republic of Germany

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

◆ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 07월 17일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

제품명 : 레가론캡슐 70 설명서 사이즈 : 125 x 202(mm) 색상 : ■ DIC 173p, ■ K

관리번호 : 071718 최종수정일자 : 2018년 08월 08일