

파모시드정 20mg

(파모티딘)

Famosid Tab, 20mg

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 파모티딘 (USP) ----- 20mg
- 첨가제 (동물유래) : 유당수화물 (소의 우유에서 유래)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이현색(03B28796), 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 콜로이드성아산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 흰색 원형의 필름코팅정

【효능·효과】

1. 주요기능 효과
위십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성위염에 의한), 역류성식도염, Zollinger-Ellison 증후군, 다음 질환의 위장막 병변 (미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

【용법·용량】

1. 위십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈 (소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성궤양에 의한), 역류성식도염, Zollinger-Ellison 증후군 : 성인 파모티딘으로서 1회 20mg 1일 2회 (아침식사 후, 저녁식사 후 또는 취침시) 경구 투여하거나 또는 1회 40mg 1일 1회 (취침시) 경구 투여한다. 상부소화관 출혈의 경우에는 보통 주시제로 치료를 개시하고, 경구투여가 가능하게 된 후에는 경구투여로 바꾼다.
2. 다음 질환의 위장막 병변 (미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기
성인 : 파모티딘으로서 1회 10mg 1일 2회 (아침식사 후, 저녁식사 후 또는 취침시) 경구투여하거나 또는 1회 20mg 1일 1회 (취침시) 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약의 성분 및 다른 H₂ 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것.
1) 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
2) 신장에 환자 (혈중 농도가 지속되므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 사용할 것)
3) 심질환 환자 (심혈관계의 부작용을 일으킬 수 있다.)
4) 간장애 환자 (증상이 악화될 수 있다.)
5) 고령자
3. 부작용
1) 중대한 부작용
① 속, 과민증 (0.1% 미만) : 속, 과민증 [아니탈락시스, 호흡곤란, 전신조증, 맥관부종 (안면부종, 인두부종 등), 두드러기 등] 을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
② 병혈구 감소, 무과립구증, 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈 (빈도불명), 혈소판 감소 (0.1% 미만) : 병혈구 감소, 무과립구증, 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈, 혈소판 감소 (초기증상으로 전신관통감, 무력, 피하·점막하 출혈, 발열 등)이 나타날 수 있으므로 정기적으로 혈액검사를 실시하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
③ 스티븐스-존슨증후군 (피부점막안증후군), 리델증후군 (중독성표피괴사증)(빈도불명) : 스티븐스-존슨증후군 (피부 점막안증후군), 리델증후군 (중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 한다.
④ 간기능 장애, 황달 (빈도불명) : AST (GOT)·ALT (GPT) 등의 상승, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑤ 황문근용해증 (빈도불명) : 황문근용해증이 나타날 수 있으므로 고칼륨혈증, 미오글로빈뇨, 혈청 중 근육효소의 현저한 상승, 근육통 등이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑥ QT 연장, 심실빈박 (토르사드 드 포인트를 포함), 심실세동 (빈도불명) : QT 연장, 심실빈박 (토르사드 드 포인트를 포함), 심실세동이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 특히 심질환 (심근경색, 판막증, 심근증 등)이 있는 환자에서 나타날 수 있으므로, 투여후 환자의 상태에 주의한다.
⑦ 의식장애, 경련 (빈도불명) : 의식장애, 전신경련 (경직성, 간대성, 근긴대성이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 특히, 신기능 장애가 있는 환자에서 나타날 수 있으므로 주의한다.
⑧ 간질성 신염, 급성 신부전 (빈도불명) : 간질성 신염, 급성 신부전이 나타날 수 있으므로, 초기증상으로 발열, 피진, 신기능 검사치 이상 (BUN·크레아티닌 상승 등) 등이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
⑨ 간질성 패혈 (빈도불명) : 고열, 가진, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 패혈이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코스테로이드를 병용투여하는 등 적절한 처치를 한다.
⑩ 부전수축 (0.1% 미만) : 다른 H₂ 수용체 길항제에서 부전수축이 나타난다는 보고가 있다.
- 2) 기타

	0.1~5% 미만	0.1% 미만	빈도불명
과민증 ¹⁾		발진·피진, 두드러기(홍반), 안면부종	
혈액 ¹⁾	백혈구 감소	호산구 증가	
소화기계	변비	설사·안면, 구갈, 구역·구토, 복부팽만감, 식욕부진, 구내염 등	
순환기계		혈압상승, 안면조증, 이명	사맥, 빈맥, 방실차단
호흡기계		기관지 경련	
간장	AST(GOT)·ALT(GPT)·ALP의 상승	총빌리루빈·LDH 상승 등	간기능 이상, 황달, 간염
정신신경계		전신관통감, 무기력감, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두중감	가역성 혼돈상태, 우울, 경련, 의식장애, 어지럼증
내분비계 ¹⁾		말경불순, 여성형유방	
기타		관절통	CK(CPK)상승, 이상미각, 근육경련

¹⁾이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

4. 일반적 주의

- 1) 치료시 경과를 충분히 관찰하여, 증상에 따라 치료상 필요최소량을 사용하며, 이 약으로 효과가 나타나지 않는 경우에는 다른 요법으로 바꾼다. 또한 혈액상, 간기능, 신기능 등에 주의한다.
- 2) 이 약은 구강내에서 분해되지만, 구강점막에서 흡수되지 않으므로 타액 또는 물로 삼킨다.
- 3) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있다.

5. 상호작용

약 물 명	임상증상·처치방법	기전·위험인자
아졸계 항진균약 이트라코나졸	이트라코나졸의 혈중 농도가 저하된다.	이 약의 위산분비 억제작용이 이트라코나졸의 경구흡수를 저하시킨다.

6. 고령자에 대한 투여

고령자는 이 약을 간량 또는 투여간격을 연장하는 등 신중히 투여한다. (주로 신장으로 배설되지만, 고령자에는 신기능이 저하되어 있는 수가 많아 혈중 농도가 유지될 우려가 있다.)

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부에 대한 투여 : 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. (임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.)
- 2) 수유부에 대한 투여 : 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유부는 수유를 중단한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다. (사용경험이 적다.)

9. 기타

이 약의 투여로 위암에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 악성이 아닌 것을 확인한 후에 투여한다.

10. 약약품동등성시험 정보

가. 시험약 파모시드정20밀리그램(파모티딘) [㈜뉴젠팜]과 대조약 동이가스타정20밀리그램(파모티딘) [동아에스티㈜]을 2x2 교차시험으로 각 1장씩 각각의 성인에게 공복 시 경구투여하여 30명의 혈중 파모티딘을 측정된 결과, 비교평가항목치 (AUC₀₋₁₂, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구 분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-12hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	동이가스타정20밀리그램 (파모티딘) [동아에스티㈜]	550.4±156.9	99.40±35.17	2.00 (1.00~6.00)	2.83±0.39
시험약	파모시드정20밀리그램 (파모티딘) [㈜뉴젠팜]	516.7±135.3	92.32±31.04	2.00 (1.00~4.00)	2.83±0.48
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8~log 1.25)		log 0.8935~0.9987	log 0.8387~1.0620	—	—

(AUC, C_{max}, t_{1/2} : 평균값±표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n=30)

AUC₀₋₁₂ : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C_{max} : 최고혈중농도

T_{max} : 최고혈중농도 도달시간

t_{1/2} : 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

【포장단위】 30정/병, 500정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

* 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

* 첨부문서를 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

개정년월일 : 2023. 03. 20.

※ 본 의약품은 우수 의약품제조관리기준 (KGMP)을満た한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변색 또는 손상된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원 등을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부 [TEL: 02-580-5900(대)]로 문의하여 주시기 바랍니다. 제품의 변경사항은 당사 홈페이지 (www.newgenpharm.com) 의 각 제품란에 기재되오며, 의약품용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 차세대 의약품 통합정보시스템 (http://nedrug.mids.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.