

사이편정

(배농산급탕)

【원료약품의 분량】 1정(1.0g)중

주 성 분	길 경(KP)	1.33g
	감 초(KP)	1.00g
	작 약(KP)	1.00g
	대 추(KP)	1.00g
	지 실(KP)	1.00g
	건 강(KP)	0.33g
	이상 수침건조엑스로서 849mg	
부 형 제	유 당(KP)	100mg
	옥수수전분(KP)	41mg
활 택 제	스테아르산마그네슘(KP)	10mg

【성 상】 담갈색의 타원형 정제

【효능 및 효과】 발적(총혈되어 붉어짐), 붓기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농성질환

【용법 · 용량】 보통성인 1회 1정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용한다.

【포 장 단 위】 10, 100, 500정

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 발적(총혈되어 붉어짐), 붓기, 통증 등의 국소 증상 이외의 두통, 오한, 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자

2) 한성농양(寒性膿瘍, 열이 없는 농양), 만성종기 환자

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

1) 고혈압 환자

2) 심장병 또는 신장병 환자

3) 부종 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

5) 고령자(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람하는 등 주의할 것.)

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

7) 지금까지 약에 의해 발진 · 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자

8) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)

(2) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

(3) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등

(4) 소화기계 : 위부불쾌감 등

2) 5~6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3) 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 악화되는 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

2) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).

2) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것.

3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사 용 기 간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 순수생약제제이므로 항상 건냉한 곳에 보관하시고, 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 파손이나 인습이 되어 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

전통생약 100년기업

Ⓢ 기화바이오생명제약(주)

경남 진주시 동진로 258(상대목)

소비자상담실:(055)761-8100



Rev No. 1

920128
130812