

간장질환용제

헤파멜즈® 인퓨전주

L-아스파라긴산-L-오르니틴

Hepa-Merz® Infusion

L-ornithine-L-aspartate

헤파멜즈® 인퓨전주는 L-아스파라긴산-L-오르니틴을 주성분으로 하여 간의 해독작용을 증가시키고 간의 에너지 생성을 촉진시켜 손상된 간기능을 회복시켜 주는 간장질환 치료제입니다.

헤파멜즈® 인퓨전주는 각종 원인에 의한 간장질환 특히 간성혼수 및 혼수전단계의 치료에 있어서 그 효능·효과가 입증된 간장질환 치료제입니다.

1) J. Hepatology 1998;28:856-864 2) J. Gastroenterology & Hepatology (2002) 17, S260-S267 3) Hepatology 1999;30:636-640
4) LEONHARDT, H., BUNGER, H. J. Med. Klin. 67, 1052 (1972) 5) Hepatology 1997;25:1351-1360

원료약품 및 구분량

1앰플(10mL) 중	
L-아스파라긴산-L-오르니틴(KPC)	5g
D-소르비톨(KP)	1g

성상 무색 내지 옅은 황색의 투명한 액이 충전된 갈색의 앰플제

효능·효과

다음의 중증의 간질환 해독 : 간경변, 만성간염, 간성뇌증(혼수 전단계·혼수 포함)

용법·용량

1. 만성간염

뚜렷한 증상(초기용량치료)에서 엘-아스파라긴산-엘-오르니틴으로서 1일 10~20g(2~4앰플)을 적정 수액제에 혼합하여 점적 주사합니다.

2. 간경변

가벼운 증상에서 엘-아스파라긴산-엘-오르니틴으로서 1회 5g(1앰플), 1일 5~20g(1~4앰플)을 적정 수액제에 혼합하여 점적 주사합니다. 중등도의 증상·간성뇌증(혼수 전단계·혼수 포함)에서 엘-아스파라긴산-엘-오르니틴으로서 1일 40g(8앰플)까지 적정 수액제에 혼합하여 점적 주사 할 수 있습니다. 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의하십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 유산염산성증 환자
- 2) 메탄올중독 환자
- 3) fructose-sorbitol 불내성 환자
- 4) fructose-1, 6-diphosphatase 결핍 환자
- 5) 심한 신부전 환자(혈청크레아티닌의 표준치가 3mg/100mL 이상)

3. 이상반응

- 1) 신경계 : 때때로 후두부의 열감이나 구역이 나타날 수 있습니다.
- 2) 때때로 위장의 불쾌감과 구토가 나타날 수 있습니다.

4. 일반적주의

- 1) 고용량을 투여하는 경우 혈중이나 뇨중의 Urea치를 검사해야 합니다.
- 2) 간기능이 제한적이라면 불쾌감이나 구토를 줄이기 위하여 개개인의 주입속도를 조절해야 합니다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법 밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위 10mL×10앰플

※본 제품을 복용하기 전에 사용설명서를 주의깊게 읽어야 하며, 사용설명서는 본 제품과 함께 보관하십시오.
※만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 대한 의사사항 및 본 사용설명서의 최종작성일자(2009년 6월 1일) 이후 변경된 내용은 한화제약 홈페이지(www.hwpharm.com) 또는 개발부(Tel:02-959-3679)로 문의하시기 바랍니다.

제조외국자

한화제약(주)

본사 : 서울특별시 성북구 석관동 261
공장 : 강원도 춘천시 남면 가정리 1256번지

제조사

아주약품공업(주)

경기도 평택시 모곡동 439번지

HEI 861101
※ HEI 090601
630447-5-1



원료공급·기술제공

Merz Pharmaceuticals GmbH

Pharma Germany