【분류번호】 124

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
· 유효성분 : 플로로글루시놀(EP)…62.238mg
· 첨가제(동물유래): 루디프레스 중 유당수화물 〈기원동물 : 소, 사용부위 : 우유〉
· 기타첨가제 : 루디프레스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 탤크

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능 · 효과】
1. 비뇨기계의 경련 및 통증 : 신염성 산통
2. 소화관 및 담도계의 기능장애에 의한 통증
3. 부인과의 경련성 통증
4. 임신중 수축의 보조치료

대화제약주식회사 우수의약품제조관리기준 KGMP적격의약소재품
서울특별시 서초구 남부순환로 2245
충청·강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 405
http://www.dhpharm.co.kr

FLOSPAN™ Tab. 500정

전문의약품

후로스판정

속효성 진경제



플로로글루시놀

【용법 · 용량】
· 성인 : 이 약을 1회 2정, 물 한 컵에 녹이거나 설하에 넣어 증상발현 시에 경구투여 한다.
· 소아 : 1회 1정, 물 한 컵에 녹여 1일 2회 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.


【사용상의 주의사항】 내부문서 참조

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 500정/병 〈개정: 2025. 05. 29〉

분리배출 HDPE 뚜껑: LDPE

(01)08806456022533



접기시 녹터 여세요

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용
1) 소화기계 : 드물게 구역, 구갈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.
2) 피부 : 알레르기반응, 급성전신성발진성농포증(Acute Generalised Exanthematous Pustulosis, AGEP)이 나타날 수 있다.
3) 기타 : 드물게 기분불량, 복시 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.

3. 상호작용
이 약은 진경작용을 나타내므로 모르핀 또는 그 유도체와 같은 진통제와는 병용투여하지 않는 것이 바람직하다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 동물실험에서 태자독성 및 기형발생은 나타나지 않았으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인(특히 초기 3개월)에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
2) 수유중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

※본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)" 에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※기타 자세한 사항이나 작성일자(2025년 05월 29일) 이후 변경된 내용은 대화제약(주) 홈페이지나 고객상담전화(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

※의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템 (https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 자발적인 부작용 보고 및 피해구제를 문의할 수 있습니다.

개정일 : 2025년 05월 29일