

활성형 비타민 B₁₂ / 필수아미노산

글루콤[®] 액

글루콤액은 채식주의자, 다이어트 등 식이요법자, 위·소장장애환자, 만성체장염환자, 당뇨병환자 등에서 결핍되기 쉬운 비타민 B₁₂의 활성형인 Coenzyme B₁₂ (코바미드) 및 7종의 필수아미노산과 L-글루타민이 복합 처방된 자양강장제입니다. 근육과 골격 형성의 원료가 되는⁴ 아미노산과 비타민 B₁₂를 보급해줌으로써 병중·병후의 빠른 회복을 도와주고, 소모성 질환자의 영양공급 및 육체 피로를 개선시켜줍니다. 또한 각 성분의 안정성을 고려하여 산제부와 액제부로 분리하여 제조된 특수 제형의 제품입니다.

■ 원료약품 및 그 분량

산제부 : 1캡 중	
· 유효성분 : 코바미드(KP)	2.5mg
L-글루타민(USP)	20.0mg
L-페닐알라닌(KP)	22.0mg
L-트레오닌(KP)	10.0mg
L-발린(KP)	16.0mg
L-메티오닌(KP)	22.0mg
L-류신(KP)	22.0mg
L-이소류신(KP)	14.0mg
· 기타 첨가제 : 만니톨, 경질무수구산, 포비돈	

액제부 : 1바이알(10mL) 중	
· 유효성분 : L-리신염산염(KP)	20.0mg
· 첨가제(보존제) : 소르빈산칼륨 26.7mg	
· 기타 첨가제 : D-소르비톨액(70%), 백당, 시트르산수화물, 시트르산나트륨수화물, 에데트산나트륨수화물, 포도엠텐스#1, 정제수	

■ 성상

상부용기내의 옅은 분홍색의 과립상 분말과 바이알 내의 과일향이 있는 무색 내지 미황색(연노랑)의 투명한 액이 든 복합제

■ 효능·효과 : 병중·병후병을 앓는 동안이나 회복 후 회복기, 소모성질환 등의 영양공급, 육체피로, 자양강장

■ 용법·용량 : 1일 1회 1바이알을 식간(식사때와 식사대 사이에)에 복용한다.

※ 복용방법 :

산제를 흔들어서 섞은 후 속 마개를 열었을 때 그림⑥번과 같이 동그란 마개가 병속에 빠지지 않고 속 마개에 달려 있는지 확인하고 드십시오.



■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
이 약 및 이 약에 포함된 성분들의 과민반응 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
의사의 치료를 받고 있는 환자

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
식욕부진, 구역, 배가 거북함, 설사 등
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
3) 이 약은 경구용으로만 사용하고 주사용으로는 사용하지 않는다.
4) 코바미드는 특히 불안정하고 광선에 예민하므로 복용하기 직전에 용액에 녹여서 복용할 것
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전뚜껑을 꼭 닫아하여 보관한다.
3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 않는다.

■ 저장방법 : 실온 건조용기, 차광보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위

{{[산제부]상부캡 158.5mg, [액제부] 10mL/바이알}×15
{{[산제부]상부캡 158.5mg, [액제부] 10mL/바이알}×45
{{[산제부]상부캡 158.5mg, [액제부] 10mL/바이알}×1

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2016년 12월 12일

■ 참고문헌

1. T. Kühne et al., Maternal vegan diet causing a serious infantile neurological disorder due to vitamin B12 deficiency, E. J. Pediatrics 1991;150(3):205-9
2. Emmanuel Andrés et al., Vitamin B12 (cobalamin) deficiency in elderly patients CMAJ 2004;171(3):251-9
3. Jolien de Jager et al., Long term treatment with metformin in patients with type 2 diabetes and risk of vitamin B-12 deficiency: randomised placebo controlled trial BMJ 2010;340
4. Volpi E et al., Basal muscle amino acid kinetics and protein synthesis in healthy young and older men. JAMA. 2001;12,286(10):1206-12.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10