

비메토카르바몰 정

bcwp 주 비씨월드제약

170908-I-R(5)

생동인중품목 전문의약품
분류번호 122

골격근이완제

비메토카르바몰 정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분 : 메토카르바몰(KP) 750.0mg

첨가제(동물유래) : 스테아르산마그네슘(소 또는 양, 지방)

기타첨가제 : 라우릴 황산나트륨, 산화티탄, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드실리콘디옥사이드, 탈크, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜 4000, 히프로멜로오스

【성 상】 흰색의 장방형의 필름코팅정제

【효능·효과】

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연속 : 요배통증, 경견완중후군, 견관절주위염, 변형성척추증

【용법·용량】

- 성인 : 메토카르바몰로서 1일 1.5~2.25g을 3회에 분할 경구투여한다.
소아에는 1일 체중 kg당 60mg을 초과하지 않는다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 또는 유사화합물(메프로바메이트 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 신장에 또는 신장애가 의심되는 환자
 - 중증의 근무력증 환자
 - 혼수 또는 전훈수상태 환자
 - 뇌손상, 간질 또는 경련의 병력이 있는 환자

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
간장애 환자(증상을 악화시킬 수 있다.)

3. 부작용

- 과민증 : 때때로 발진, 두드러기, 가려움, 드물게 속유사증상 등의 증상이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 순환기계 : 때때로 서맥, 혈압저하 등이 나타날 수 있다.

- 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 취정거림, 운동실조, 두통, 두중감, 졸도, 실신, 드물게 시력불선명 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
- 소화기계 : 때때로 구역·구토, 식욕부진, 가슴쓰림·위정체감·위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 감각기계 : 때때로 금속성의 미감을 느낄 수 있다.
- 기타 : 발열, 비충혈이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

- 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 단독투여하는 것이 바람직하나 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 주의한다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 바르비탈계 약물 등의 중추신경억제제, MAO 저해제
- 염산탈페리손과 병용투여시 시소절장애가 나타났다는 보고가 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.
- 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

7. 소아에 대한 투여

영·유·소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어있지 않다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

9. 임상감사치에 대한 영향

요중 5-히드록시인돌초산 및 요중 바닐만델산치를 상승시킨다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 300정/병, 500정/병

- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.
- ※ 본 제품에 관련된 문의는 소비자상담전화 : 02)2182-0400으로 연락하시기 바랍니다.
- ※ 구입시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품인 경우 복용(사용)하지 마시고 구입처에서 교환하시기 바랍니다.
- ※ 본 첨부문서의 변경된 최신내용은 당사 소비자상담실 또는 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

의약품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

170908-I-R(5)

설명서 최종 개정년월일 2017년 09월 08일

제조·판매원 :



주 비씨월드제약

서울시 강남구 개포로22길 78 경빌딩
공정·경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23
소비자상담실 : 02)2182-0400
www.bcwp.co.kr

