

플루신정

(플로로글루신)

bcwp 주 비씨월드제약

171011-I-R(7)

생동인중품목 전문의약품
분류번호 124

진경제

플루신정

(플로로글루신)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 플로로글루신(KP) 80.0mg
- 첨가제(동물유래) : 루디프레스(유당수화물, 소의 우유)
- 기타첨가제 : 저지환도히드록시프로필셀룰로오스, 탕크

【성 상】 백색 원형의 설하정

【효능·효과】

- 비노기계의 경련 및 통증 : 신염성 산통
- 소화관 및 담도계의 기능장애에 의한 통증
- 부인과의 경련성 통증
- 임신중 수축의 보조치료

【용법·용량】

- 성인 : 플로로글루신으로서 1회 160mg을 물한컵에 녹이거나 설하에 넣어 증상발현시에 경구투여한다.
 - 소아 : 1회 80mg을 물한컵에 녹여 1일 2회 투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약에 과민증 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유 당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 부작용
 - 소화기계 : 드물게 구역, 구갈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.
 - 피부 : 알레르기반응이 나타날 수 있다.

3) 기타 : 드물게 기분불량, 복시 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.

3. 상호작용

이 약은 진경작용을 나타내므로 모르핀 또는 그 유도체와 같은 진통제와는 병용투여하지 않는 것이 바람직하다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 동물실험에서 태자독성 및 기형발생은 나타나지 않았으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인(특히 초기 3개월)에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 수유중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 500정/병

- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.
- ※ 본 제품에 관련된 문익는 소비자상담전화 : 02)2182-0400으로 연락하시기 바랍니다.
- ※ 만약 구입시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품인 경우 복용(사용)하지 마시고 구입처에서 교환하시기 바랍니다.
- ※ 본 첨부문서의 변경된 최신내용은 당사 소비자상담실 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

의약품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

171011-I-R(7)

설명서 최종 개정년월일 2017년 10월 11일

제조·판매원 :



주 비씨월드제약

서울시 강남구 개포로22길 78 경빌딩
공장: 경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23
소비자상담실 : 02)2182-0400
www.bcwp.co.kr

