

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

초기 감기치료제

액티페린정

K G M P	일반의약품
적격업체	분류번호: 141

ACTIPERIN Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

트리프톨리딘염산염수화물(USP).....2.5mg
수도에페드린염산염(USP).....60.0mg
동물유래성분 : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

【성상】 백색의 원형 정제

【효능·효과】

코감기, 알레르기 및 혈관운동성 코염에 의한 다음 증상의 완화
: 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물

【용법·용량】

성인 : 1회 1정
소아(12~14세) : 1회 1/2정
1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약에 과민반응 병력이 있는 환자
 - 중증(심한 증상)의 간 및 신기능 장애 환자
 - 중증(심한 증상)의 관상 심장 질환 환자
 - 잔뇨 형성을 수반하는 배뇨(소변을 뚫)장애 환자
 - 고혈압 및 관상동맥(심장동맥) 질환 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 2세 이하의 영아(자녀나기)
 - MAO 억제제를 투여중인 환자
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 혈압강하제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO 억제제, 교감 신경흥분제, 삼환계 항우울약, 구아네티딘, 브레틸리움, 베타나이드, 데브리소퀸, 메칠도파, 교감신경성약(충혈제거제, 식욕억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제(억제제)와 병용(함께 복용)투여하지 않는다.
 - MAO 억제제의 긴 작용시간 때문에 MAO 억제제 투여 최소 15일 후 이 약을 투여한다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

이 약의 투여 중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 천식 환자
 - 녹내장 환자
 - 심질환 및 부정맥 환자

- 4) 당뇨병, 갑상샘기능항진증 환자
- 5) 전립샘비대로 인한 배뇨(소변을 뚫)곤란 환자
- 6) 12세 미만의 소아
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

 - 1) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 경우
 - 2) 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한(땀이 남), 경미한(가벼운) 혈압 강하, 시력장애, 산동(동공확대), 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직(굳음), 아테토시스, 간대상 및 강직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비 등의 중추신경계 이상이 나타날 경우
 - 3) 피부반응, 일시적인 자극통, 작열감(화끈감) 등의 과민반응이 나타날 경우
 - 4) 구갈, 구역, 구토 등의 소화기계 이상이 나타날 경우
 - 5) 배뇨(소변을 뚫)곤란 등의 이상이 나타날 경우
 - 6) 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있다.
6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항.

과량투여 시 급성 중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광 카테터 삽입법을 사용한다. 슈도에페드린 제거에는 투석하도록 한다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 10정, 500정

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 사용기한은 제품 포장에 표시된 6자리 숫자 『○○.△△.□□』로 표기되어 있으며 ○○년 △△월 □□일 까지 복용가능한 의약품입니다.

- * 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약(주) 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드릭(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)→「정보마당」→「의약품」 등 정보를 참조하세요.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이디드릭→보고마당→안전성정보→의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 제조판매원 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 문화12길 6-1
- ☎ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

개정년월일 : 2017년 06월 22일



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr