

위 · 장관 운동기능조절제

K G M P

일반의약품

적격업체

분류번호: 239

베부틴® 정

(트리메부틴말레산염)

VEBUTIN Tab.

베부틴정은 프랑스 Jouveinal Lab.에서 개발한 새로운 약리작용의 위 · 장관기능조절제입니다.

종래까지도 위 · 장관에 작용하는 약제들은 자율신경 또는 중추신경을 작용부위로 하며 소화관 외부신경계에 작용하여 소화관 운동을 억제 또는 촉진시키는 작용의 일방성을 갖고 있으므로 구갈, 산동, 발한(땀이남)등의 중추성 부작용이 있는데 비해 새로운 베부틴정은 위 · 장관내부신경계의 내성 조절인자인 위 · 장관내의 내부신경계(Auerbach plexus)에 주로 작용하여 위 · 장관운동을 정상화시키는 위장관기능 개선제로서 안정성을 충분히 확보하고 효과가 탁월합니다.

베부틴정은 위 · 장관 장애의 대부분을 차지하는 과민성 대장질환, 경련성 결장에 대하여 우수한 양면적 기능조절작용과 함께 진경작용을 나타내며 위장운동기능 부전에 의한 소화불량에 대하여도 위 연동운동을 촉진시켜 줍니다.

베부틴정은 소화관 운동기능 이상으로 일어나는 기능적 소화불량(위무력증), 기능적 결장질환(과민성 대장염, 경련성 결장)에 특히 유효한 일차적 선택의 약제입니다.

베부틴정은 내약성(약에대한 내성)이 거의 완벽한 약물로서 장기치료와 유 · 소아 및 노령자의 치료에 가장 적합한 약제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 트리메부틴말레산염(KP) 100.0mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 백색의 원형 정제

【약리작용 및 특징】

1. 위 · 장관운동의 양면 조절작용을 합니다.
베부틴정은 소화관 내부 신경계에 선택적으로 작용하여 과도하게 항진하거나 억제된 기능을 조절하는 양면작용으로 과민성 대장증후군(변비, 설사)과 기능적 소화불량(위 기능 무력증, 식욕부진, 오심, 구토)에 우수한 작용을 합니다.
2. 유 · 소아의 위장기능 조절작용
베부틴정은 유 · 소아의 습관적인 구토, 설사, 변비에 대하여 위 · 장관 기능조절작용에 의한 치료 효과를 높여 줍니다.
3. 연동운동 촉진작용
연동수축파를 부활 강화시켜 위 · 십이지장의 연동운동을 촉진시킴으로 오심, 구토를 개선시켜 줍니다.
4. 경련성 동통억제작용
베부틴정은 기능적 결장질환 또는 엑스선(내시경) 검사시의 유문 및 결장경련, 가스팽만에 기인하는 경련성 동통(통증)에 대한 국소마취작용과 진경작용(경련멈춤작용)이 우수합니다.

【효능 · 효과】

1. 주효능 효과
 - 1) 식도역류 및 열골헤르니아, 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능 이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
 - 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
 - 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면장애

【용법 · 용량】

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg(1~2정) 1일 3회 식전에 경구투여한다(먹는다, 복용한다).
연령(나이) 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당 - 갈락토오스 흡수장애(glucose - galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이상반응
 - 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
 - 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
 - 5) 과민증 : 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
3. 임부에 대한 투여
임신중의 투여에 대한 안정성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
4. 수유부에 대한 투여
수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

【포장단위】 10정, 500정

【저장방법】 기밀봉기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 사용기한은 제품 포장에 표시된 6자리 숫자 『○○.△△.□□』로 표기되어 있으며 ○○년 △△월 □□일 까지 복용가능한 의약품입니다.

- * 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약(주) 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.
- * 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이디드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 제조판매원 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 문화12길 6-1
- ※ 이상반응보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

☞ 의품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

개정년월일 : 2017년 09월 06일



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr