

물없이 먹는 산뜻한 멀미약

보미롱

K G M P

일반의약품

적격업체

분류번호: 235

VOMILONG Powder

【원료약품 및 그 분량】 1포(1g) 중

메클리진염산염수화물(KP) 25.0mg

스코폴라민브롬화수소산염수화물(KP) 0.1mg

※ 타르색소 : 황색4호(KPTaCS)

※ 동물유래성분 : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

【성 상】 황색의 산제

【효능·효과】 멀미에 의한 어지러움·구토·두통의 예방 및 완화

【용법·용량】

멀미의 예방에는

- 성인 - 1회 1포(1.0g)
- 소아 - 14~11세 : 2/3포(0.7g), 10~7세 : 1/2포(0.5g), 6~3세 : 1/3포(0.3g)
를 승차 30분전에 복용한다. 또 필요시 추가복용할 경우에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용한다. 1일 복용횟수는 1일 2회를 한도로 한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 약으로 알레르기증상[발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증 등]을 일으킨 일이 있는 사람
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 3) 심장에 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함) 환자, 배뇨(소변을 뚫)장애 환자, 쇠약 환자, 고령자
 - 4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
 - 5) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이성분에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이상반응
 - 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 2) 이 약을 투여함으로써 두통, 안면홍조, 눈부심, 배뇨(소변을 뚫)장애 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 3) 이 약을 투여함으로써 구갈(목마름) 또는 변비가 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 1) 이 약은 극약에 속하는 성분을 함유하고 있으므로 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
 - 3) 이 약을 투여함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
 - 4) 1포를 분할한 후 잔량을 사용할 경우에는 입구를 잘 봉하여 보관하고 2일 이내에 사용한다.
- 상호작용
다음 약물과 병용투여하지 않는다. : 다른 진통제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제, 진해거담제, 위장진통·진경제 등
- 소아에 대한 투여
이 약은 3세 미만의 영·유아(젖먹이·유아)에게 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사일광을 피하고 되도록이면 서늘한 곳에 보관한다.
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 2포

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 사용기한은 제품 포장에 표시된 6자리 숫자 『○○.△△.□□』로 표기되어 있으며 ○○년 △△월 □□일 까지 복용가능한 의약품입니다.

- * 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약(주) 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.
- * 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이디드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 제조판매원 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 문화12길 6-1
- ☎ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

개정년월일 : 2016년 05월 18일



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr