

아 시 틴 캡슐

(아세틸시스테인)

【성 상】

바닐라향이 나는 흰색의 결정성 분말이든 담청색의 경질캡슐제

【원료약품분량】 1캡슐 중

아세틸시스테인(USP) 200mg
유당수화물(KP) 기원:동물유래(건강한 소의 우유)

【효능 · 효과】

다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급 · 만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성섬유증

【용법 · 용량】

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 복용한다.

1	급 성 질 환	성 인 소 아	1회 200mg, 1일 3회 6~14세, 1회 200mg 1일 2회
2	만 성 질 환	성 인 소 아	1회 200mg, 1일 2회 6~14세, 1회 100mg 1일 3회
3	낭 성 섬 유 증	소 아	6세 이상, 1회 200mg 1일 3회

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 위 · 십이지장궤양 환자
 - 2세 미만 영아
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 임부 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
 - 수유부 : 이 약이 모유로 분비되지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등
 - 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등
 - 드물게 빈맥, 고혈압
 - 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 호흡곤란
- 기타 이 약을 복용시 주의할 사항
 - 경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리트로마이신, 치말페니콜)과 함께 복용시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).
 - 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기 / 사용기간 2년

【포장단위】

30캡슐, 500캡슐 (자사포장단위)

- ※ 의약품을 사용하시기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어주시기 바라며, 설명서는 반드시 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 만일 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 때는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 자세한 내용은 자사로 문의하시길 바랍니다. (소비자 상담실: 02-6925-4064)
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 설명서 (재)작성일 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(<http://www.pharmaking.co.kr>)에서 확인 하실 수 있습니다.

(재)작성일 : 2015. 11. 18.