

항바이러스제

# 에크로바<sup>®</sup> 크림

(아시클로버)

## Aclova<sup>®</sup> Cream.

### ■ 성분·함량 : 1g 중

아시클로버 (USP) ..... 50mg

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 (KP) ..... 1.6mg

파라옥시벤조산프로필 (KP) ..... 0.4mg

### ■ 성상

백색의 크림제

### ■ 효능·효과

단순포진(물집) 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진(물집)과 구순포진(물집) 포함)

### ■ 용법·용량

1) 이 약은 약 4시간 간격으로 1일 5회 환부(질한 부위)에 바른다.

2) 치료는 5일간 계속하여야 하며, 5일간 사용 후에도 치료되지 않을 경우에는 5일간 더 사용할 수 있다.

### ■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있거나 화학적 불내성 환자 2) 수유부 3) 소아 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 에이즈 환자 또는 골수(뼈속질)이식 환자 등 면역결핍 환자 2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 3. 이상반응 1) 궤양이 생긴 생식기 부위의 특성상 이 약의 사용으로 인해 압통(누르는 통증) 등의 불쾌감을 느낄 수 있다. 2) 일시적인 작열감(화끈감), 자통(찌르는 것 같은 아픔)을 포함하는 가벼운 동통(통증) 및 접촉피부염, 홍반성 발진, 습진, 알레르기반응 및 때때로 도포(바른)부위의 자극감, 가려움, 외음염, 안면(얼굴) 부종(부기), 피부 탈색, 두드러기, 발진, 소수포성(물집성) 발진이 나타날 수 있다. 3) 홍반(붉은 반점), 가려움이 나타났거나 피부가 약간 건조해지고 벗겨질 수 있다. 4. 일반적주의 1) 치료는 가능한 한 초기에 시작하고, 재발성인 경우에는 전구증상 또는 병소(아픈 부위)가 처음 나타날 때 시작하는 것이 바람직하다. 2) 정해진 용법·용량 및 투여기간을 지키고, 징후나 증상이 없는 사람에게는 사용하지 않는다. 3) 이 약은 타인으로부터의 감염이나 재발성 단순포진(물집) 감염증의 예방 목적으로 사용하지 않는다. 4) 이 약의 내성 발생에 대한 근거는 없으나 그 가능성을 배제할 수는 없다. 5) 이 약물을 화석하거나 다른 약물을 혼합하기 위한 기제로 사용하지 않는다. 5. 상호작용 : 이 약과 연관성은 밝혀지지 않았으나, 전신투여한 아시클로버의 혈장 반감기 및 AUC가 프로베네시드에 의해 증가하였다. 6. 임부 및 수유부에 대한 투여 1) 토끼, 랫트, 마우스 등에 아시클로버를 전신 투여한 동물실험에서 기형발생은 관찰되지 않았으나, 랫트의 모체에 신장배(신장장애)를 유발할 정도의 용량을 피하(피부밑) 투여시, 태자의 머리 및 꼬리의 이상이 나타났다. 2) 임부에 대한 투여 경험이 많지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 사용한다. 3) 이 약 사용 중에는 수유를 하지 않는다(전신투여 후

아시클로버가 유즙 중으로 분비된다는 보고가 있다). 7. 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확인되어 있지 않다. 8. 적용상의 주의 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 안과용으로 각막, 점막에 사용하지 않는다. 3) 이 약을 입이나 눈 또는 질과 같은 점막에 사용할 경우, 자극감이 나타날 수 있다. 4) 이 약이 신체의 다른 부위로 퍼지거나 타인에게 감염시키는 것을 방지하기 위해 끝무나 고무장갑을 낀 상태에서 바른다.

### ■ 포장단위

5g

### ■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당영업소에서 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국 의약품안전관리원 (drugsafe.or.kr → 의약품유해사례보고)에 알리시기 바랍니다.

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 먹지 마십시오. 눈, 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

※ 사용 후 뚜껑을 바로 닫지 않아 내용물이 흐를 수 있으니 주의하십시오.  
"이 첨부문서 개정일(15년 6월)이후 변경된 내용은 [www.kdpharma.co.kr](http://www.kdpharma.co.kr)나 02-576-6121,3에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다."

제조원 : 한국콜마주)

세종특별자치시 전의면 산단길 245

제조외의뢰·판매원 : 경동제약주)

경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121,3



경동제약주식회사