

광범위 진경작용제-장관운동 정상화 기능

타론주

(티로프라미드염산염)

Taron Inj.

■ 성분·함량 : 1앰플(3ml) 중

티로프라미드염산염(별규) 50mg

첨가제 : 디만니톨, 주사용수, 에탄올

■ 성상 : 무색투명한 액이 든 갈색앰플제

■ 효능·효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 :
간·담도 산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 :
위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

■ 용법·용량

성인 : 티로프라미드염산염로서 1회 50mg(3ml)을 근육 또는 정맥주사한다.
필요에 따라 1시간 후에 반복 투여할 수 있다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 이상반응을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하
되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
- 2) 거대결장, 허탈 환자
- 3) 이 약에 과민증 환자
- 4) 중증의 간부전 환자

3. 다음의 환자에는 신중히 투여할 것

항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여
한다.

4. 이상반응

- 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투
여를 중지한다.

5. 상호작용

혈압강하 약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하
효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.

6. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의
사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여한다.

7. 적용상의 주의

저혈압 환자에 정맥주사하는 경우에는 천천히 주사한다.

■ 저장방법

차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위

3ml×50Amp.

※본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질
관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통 과정 중 변질, 변패 또
는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당영업소에서
교환하시기 바랍니다.

"이 첨부문서 개정일(13년 7월)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr나
02-576-6121,3에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의
약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다."

제조·판매원 : 경동제약(주)

공장 : 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121,3



경동제약주식회사

• 작성년월 : 1994. 05
• 개정년월 : 2013. 07

개정번호 : 1310S