

광범위 진경작용제-장관운동 정상화 기능

타론 캡슐

(염산티로프라미드)

전문의약품
분류번호: 124



Taron Cap.

■ 성분·함량 중

염산티로프라미드(별규) 100mg
첨가제(타르색소) : 적색 3호, 청색 1호

■ 성상

백색의 가루가 든 상부 연청색 하부 백색의 경질캡슐제

■ 효능·효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 :
간담도 산통, 여러원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통.
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 :
위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착.

■ 용법·용량

- 성인 : 염산티로프라미드로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구투여한다
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
- 2) 거대결장, 허탈 환자
- 3) 이 약에 과민증 환자
- 4) 중증의 간부전 환자
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당불내 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음의 환자에는 신중히 투여할 것

항콜린작용을 나타내지 않지나 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

- 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

4. 상호작용

혈압강하 약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여한다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위

30캡슐, 100캡슐

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당영업소에서 교환하시기 바랍니다.

※ 약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(drugsafe.or.kr→약품유해사례보고)에 알리시기 바랍니다.

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 화재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 이 약은 의사 또는 치과의사의 처방에 의하여 복용할 수 있는 전문약품입니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

"이 첨부문서 개정일(09년 11월)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr나 02-576-6121,3에서 확인할 수 있으며, 약품용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다."

제조·판매원 : 경동제약(주)

공장 : 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121,3



경동제약주식회사

• 작성년월 : 1999. 02

• 개정년월 : 2009. 11

개정번호 : 1509S