

아트락트정

(클로르페네신카르바메이트)

【원료약품의 분량】 1정 중

클로르페네신카르바메이트(KP)..... 250mg

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

근골격계 질환에 수반하는 동통(통증)성 연축(수축과 이완) : 요배(허리, 등)통증, 병형성척추증, 추간판ヘルニア, 척추분리·전위(변위)증, 척추골다공증, 경견완증후군(목어깨팔증후군)

【용법·용량】

성인 : 클로르페네신카르바메이트로서 1회 250mg, 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 및 유사화합물(메토카르바몰 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 간장애 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 간장애의 병력이 있는 환자
 - 신장애(신장장애) 환자
- 이상반응
 - 과민증 : 때때로 발진, 부종(부기) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 드물게 두통, 두중감(머리무거움), 무력·권태감 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량(줄임) 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
 - 소화기계 : 때때로 구역·구기(메스꺼움), 위통, 위부불쾌감, 위정체감, 식욕부진, 구갈(목마름) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 혈액 : 드물게 백혈구감소, 혈소판감소 등이 나타날 수 있다.
 - 피부 : 독성표피괴사증후군(Lyell증후군)이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 취해야 한다.
- 일반적 주의
 - 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
 - 장기간 투여한 경우의 안전성이 확립되어있지 않으므로 장기간 투여시에는 임상검사(혈액검사, 요검사 및 간기능검사 등)를 하는 것이 바람직하다.
- 상호작용

다음 약물과의 병용(함께 복용) 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 이러한 경우에는 투여하지 않는 것이 바람직하지만 부득이하게 병용(함께 복용)하는 경우에는 감량(줄임)하는 등 신중히 투여한다. : 페도치아진계 약물(클로르프로마진 등), 중추신경억제제(바르비탈계 약물 등), MAO저해제
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상 유의성이 위험성을 상회한다고 판단된 경우에만 투여한다.
 - 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 소아에 대한 투여

유·소아에 대한 안전성이 확립되어있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 1000정

【제 조 자】 신일제약(주) 충북 충주시 양성면 복상골길 28

【제조외곽지】 한국넬슨제약(주) 충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.

※이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은(02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.

※제품의 유효기간은 외투용기에 표시되어 있습니다.

※첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사·약사 또는 식품의약품안전처 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

최종개정일자 : 2016. 02. 25