



전문의약품
분류번호:123

위·장 기능 이상 치료제 푸로페날 정 20mg (옥틸로늄브롬화물)

고도의 산업사회에 살고 있는 현대인은 불규칙한 식생활, 자극성 식품의 과다섭취, 흡연, 음주, 스트레스 등에 의하여 위나 장 또는 복합적으로 그 기능에 이상이 생겨 고생하는 경우가 많습니다. 푸로페날정은 위·장의 평활근에 직접 작용하여 운동기능을 정상화함으로 위·장관의 경련이나 기능저하에 우수한 치료효과를 발휘하고 과민성 대장증상으로 일어나는 복통, 설사, 복부팽만감 등을 신속히 개선시켜 줍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중
옥틸로늄브롬화물(KP) 20mg

【성 상】 흰색의 원형 필름코팅정

【약리작용 및 특징】

- 푸로페날정은 위·장관의 평활근에 선택적으로 작용합니다.
근육의 수축에는 Ca^{++} 이 절대적으로 관여하는 것으로 밝혀지고 있습니다. 푸로페날정은 위·장관 평활근에 선택적으로 관여하여 Ca^{++} 의 유입을 차단함으로써 대장근육의 이상증상들을 치료합니다.
- 푸로페날정은 자각증상의 개선이 확실합니다.
투여 30분 후부터 대장기능 이상증후군의 개선효과가 나타나고 95%이상의 임상효과를 나타냅니다.
- 푸로페날정은 위·장관의 연동운동의 조절 등 일련의 위·장 기능을 정상화함으로 팽만감, 위부불쾌감, 설사, 변비 구토 등의 자각증세를 신속히 개선하고 그 작용도 매우 지속적입니다.
- 푸로페날정은 항choline성 부작용이 없습니다.
주목할 만한 항 경련제로서 국소부위에서만 선택적으로 작용하고 전신흡수가 거의 되지않아 항choline성 부작용(위액분비감소, 구갈(목마름), 어지러움, 빈맥(빠른맥), 배뇨(소변을 똥)장애)이 거의 없습니다.

【효능 · 효과】
위장관 경련 및 과민성대장증후군

【용법 · 용량】

성인 : 옥틸로늄브롬화물로서 1회 20~40mg을 1일 2~3회 경구투여한다(복용한다.),
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 이 약에 과민증 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것 : 녹내장 환자
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 500정

【제 조 자】 (주)유영제약 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33

【제조외사】 한국넬슨제약(주) 충청북도 음성군 금왕읍 금일로 271-8

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.
※이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은(02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.
※제품의 유효기간은 외부용기에 표시되어 있습니다.
※첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사·약사 또는 식품의약품안전처 (이지드렉 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

최종개정일자 : 2014. 12. 05.

판 매 윌
NIELSON 한국넬슨제약
충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8
소비자 상담실 (02)588-0941